

1. ఫస్ట్ నైట్-సెక్స్ ఫుల్ సెక్స్
2. సెక్స్ భయాలు
3. సెక్స్ అపోహలు - వాస్తవాలు
4. అంగ స్తంభన వైఫల్యం - చికిత్స
5. సందేహాలు ఇంకా ఇవ్ - అవ్
6. పురుషాంగం పూర్వచర్చం మూసుకుని ఉంటే
7. మగువైనప్పటికీ మగవాని పై మనసు కలగదు. ఎందుకని ?
8. కోరిక కలగకపోవడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి ?
9. సెక్స్ మీద మానసిక ఒత్తిడి ప్రభావం
  10. కొందరు స్త్రీలకి సంయోగం నొప్పి ఎందుకని ?
  11. స్త్రీలకి మూత్రవిసర్జనలో మంట ఎందుకని ?
  12. పెద్దాపరేషను అయిన ఎంతకాలానికీ సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు ?
  13. ఓల్డ్ డేస్ సెక్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టవలసిందేనా ?
  14. గర్భం రావడానికి వీర్యకణాల సంఖ్య ఎక్కువ ఎందుకు ఉండాలి ?
  15. వీర్యకణాలని నిర్వీర్యం చేసే వింత పరిస్థితి
  16. దాంపత్యం - గర్భధారణ
  17. భార్య భర్తల బ్లడ్ గ్రూపులు
  18. స్త్రీలో అండం విడుదల
  19. పిల్లలు కలగనప్పుడు చిన్నాపరేషను
20. స్త్రీలలో ట్యూబులు మూసుకుపోతే గర్భం రాదా?
21. సంతానం కలగకపోవడంలో సెక్స్ ప్రాబ్లమ్
22. సంతానం కలగకపోవడంలో పురుషుని పాత్ర
23. గర్భం రావడానికి వీర్యకణాల సంఖ్య ముఖ్యమా ?
24. గర్భం - కాన్పు
25. గర్భిణీ తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
26. గర్భిణీ తీసుకోవలసిన ఆహారం
27. గర్భిణీ స్త్రీకి బి-కాంప్లెక్స్ బిళ్ళలు
28. పాలు ఎక్కువ పడాలంటే తల్లి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ?
29. బాలింతరాలిలో మైల ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ? దాంపత్యం ఎంతకాలానికీ ?
30. కాన్పు తర్వాత సెక్స్ తృప్తిలో తేడా

## 1. ఫస్ట్ నైట్-సెక్స్ డేస్ సెక్స్

డాక్టర్, మాది ప్రేమ వివాహమే. ఆయనంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. పెళ్ళికి ముందు ఆయన నన్ను దగ్గరకు తీసుకుంటే ఎంతో పులకించిపోయేదాన్ని. వారి వేడి కౌగిలిలో నేను ఎంతో వేడిగా మారేదాన్ని. ఆయనతో ఎప్పుడు ఒక్కటవుతానా అని తహతహలాడేదాన్ని. మొదటిరాత్రి మొదటి కలయికలో మొత్తం మాధుర్యాన్ని నా సొంతం చేసుకోవాలని శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఎంతగానో ఉవ్విళ్ళూరాను. కాని నా మొదటి రాత్రి దానికి భిన్నంగా మారింది. మా శరీరాలు రోండా ఒకటవుతూంటే హాయిగా అనిపించే బదులు అంతులేని బాధగా అనిపించింది. బాధను తట్టుకోలేక గట్టిగా కేకలు కూడా పెట్టాను. అంతటితో మా వారు ఇంక ఏమి చేయకుండా ఊరుకున్నారు. తొలి కలయికలు అందరికీ ఇలాగే బాధా కరంగా ఉంటాయా? ఎంతకాలం ఇలా బాధపడ వలసి వస్తుంది? అసలు బాధ కలగకుండా సెక్స్ లో పాల్గొనడం కుదరదా? అంటూ ఎంతో ఆవేదనతో అడిగింది అనిత.

అసలు తొలి కలయిక అంత బాధాకరంగా మారనవసరం లేదు. స్త్రీ మనస్సు సెక్స్ కి సమాయత్తమైతే యోని కండరాలు పట్టు వదిలేస్తాయి. యోని ద్వారం, యోని మార్గం వదులైపోతాయి. యోని దగ్గర ద్రవాలు స్రవించి ఆంగప్రవేశం తేలికగా జరుగుతుంది. ఇటువంటి అనుకూల పరిస్థితి ఏర్పడాలంటే సెక్స్ లో పాల్గొనేముందు (ఫోర్స్) అవసరం. దాంతో భర్త మీద క్రేజ్ పెంపొందడమే కాకుండా కోరికతో మనస్సు తనువు రెండూ సెక్స్ కి రెడీ అవుతాయి. అప్పుడు ఆంగప్రవేశం తేలికగా అవుతుంది.

### **క్రేజీలుక్స్ తోపాటు జెల్లీ కూడా అవసరమే**

స్త్రీ మనసు కోరికతో వేడెక్కిన తరువాత సంయోగానికి వెంటనే ప్రయత్నించకుండా భర్త తన చూపుడు వ్రేలుని యోనిలోనికి జొప్పించి ఇటు అటు కదుపుతూ యోని ద్వారాన్ని యోని మార్గాన్ని వెడల్పు చేయాలి. వేలుకి గోళ్ళు లేకుండా ముందే జాగ్రత్త పడాలి. వేలుకి నూనెగాని, వేజలైన్ గాని, ఆముదంగాని ఏదైనా కాస్త రాసుకుని యోని ద్వారంలోకి జొప్పిస్తే యోని ద్వారం జారుడుగా మారుతుంది.

జెలోకైన్ జెల్లి లేదా కె.వై.జెల్లి లేదా ఫెయిన్ జోల్లీ ముందుగానే దగ్గర ఉంచుకుంటే వాటిని వాడటం మరీ మంచిది. చూపుడు వేలు పైకి పై జెల్లీల్లో ఏదో ఒకటి వేసుకుని యోని ద్వారం చుట్టూతా రాయాలి. ఆ తరువాత యోని మార్గం లోపలికెళ్లా రాయాలి. చూపుడు వేలుని యోని మార్గం లోపలికెళ్లా పూర్తిగా జొప్పించాలి. యోని మార్గాన్ని వెడల్పు చేయాలి.

జెలోకైన్ జెల్లీగాని కె.వై.జెల్లీగాని, ఫెయిన్ జెల్లీగాని రాయడం వల్ల అక్కడ నరాలు మొద్దుబారి సెక్స్ లో నొప్పి తెలియకుండా అవుతుంది. కొందరు స్త్రీలకి సెక్స్ లో మొదటి కలయికల్లో బాధ అనిపిస్తుంది. ఈ జెల్లీలు ఆ బాధను లేకుండా చేస్తాయి. అంతే కాకుండా యోని దగ్గర జారుడుగా మారుస్తాయి. దానితో సునాయాసంగా యోనిలోకి ఆంగప్రవేశం జరిగిపోతుంది. ఈ రకంగా రోండా-మూడు రోజులు ప్రతీసారి సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు జెల్లీతో అవసరం ఉండదు. యోని రంధ్రాన్ని వేలితో కొద్దిగా వెడల్పు చేసినా తేలికగా ఆంగప్రవేశం జరుగుతుంది.

అంగప్రవేశం జరిపే ముందు పురుషుడు పురుషాంగం పూర్వచర్మాన్ని శిశ్నం వెనక్కి లాగాలి. పురుషుడు కూడా శిశ్నం మీద జెల్లె రాసినట్లైతే అంగప్రవేశం తేలికగా జరుగుతుంది. పురుషాంగం పూర్వచర్మాన్ని వెనక్కి లాగకుండా సెక్స్ లో పాల్గొంటే అంగప్రవేశం జరగడం కొంత కష్టం అవుతుంది.

### తొలి కలయిక సెక్స్ నీకి భార్య సహకారం అవసరం

చాలామంది స్త్రీలు సెక్స్ చేయవలసిన బాధ్యత భర్తదే అనుకొంటారు. అందుకని అంగ ప్రవేశం జరగడానికి ఏ మాత్రం సహకరించరు. కాని తొలి కలయికలు సెక్స్ ఫుల్ గా జరగాలన్నా బాధ లేకుండా అవ్వాలన్నా భార్య సహకారం అవసరం. భార్య సహకరించకపోయినట్లైతే చాలా సందర్భాల్లో పురుషాంగం యోని రంధ్రంలోకి ప్రవేశించకుండా దానికి ఇటూ అటూ క్రిందా పైనా తగులుతుందే తప్ప యోని రంధ్రంలోకి ప్రవేశించదు. దానికి కారణం కొత్త పెళ్ళికూతురులో యోని రంధ్రం బాహ్య ధరాలతో మూసి ఉండటమే.

స్త్రీ వెల్లకిలా పడుకుని రెండు కాళ్ళని మోకాళ్ళ దగ్గర ముడిచి, పక్కకి మంచి రతికి అనుకూలంగా పడుకోవాలి. సంయోగంలో స్తంభించిన పురుషాంగాన్ని తన చేత్తో పట్టుకుని యోని రంధ్రంలోకి ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. యోనిలోకి పురుషాంగం పూర్తిగా ప్రవేశించే వరకు దానిని పట్టుకొని సహకారం అందించాలి. అలా చేస్తేనే మొదటి కలయికలు తేలికగా జరుగుతాయి.

### బాధలేని మొదటి కలయికకు ముద్దుముచ్చట అవసరం

మొదటి కలయిక ఏదో బలవంతం చేయడం కాకుండా ముద్దు ముచ్చట్లతో మనస్సుని రంజింపచేసిన తరువాతే చేయడం అవసరం. రకరకాలుగా స్త్రీని పురుషుడు, పురుషుడి స్త్రీ సెక్స్ పరంగా ప్రేరేపించుకోవాలి. మూడ్ క్లెయిమ్ కి చేరుతున్న సమయంలో ముందుగా చెప్పకున్న విధంగా యోని రంధ్రాన్ని వేలుతో వెడల్పు చేయాలి. అలా వేలుతో యోని రంధ్రం వెడల్పు చేయడం కూడా సెక్స్ పరంగా చక్కని ప్రేరణ అవుతుంది. ఆ పైన అంగప్రవేశం జరపాలి.

ఇంత చేసిన తదుపరి కూడా కొందరు స్త్రీలకి కొంత బాధ అనిపించవచ్చు. అయినా అది భరించే స్థాయిలోనే ఉంటుంది. కాని సెక్స్ చివర దశలో కలిగిన తృప్తి ఆ బాధని మరిపింపచేస్తుంది.

### మైకంలో మజా - మరుసటి రోజుకి వ్యధ

కొందరు స్త్రీలకి మొదటి రోజు సెక్స్ లో ఎన్నిసార్లు పాల్గొన్నా ఎటువంటి బాధ అనిపించదు. పైగా ఆ ఎక్స్ పీరియన్స్ బ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది. కాని మరుసటి రోజుకి యోని దగ్గర మంట, నొప్పి మొదలవుతాయి. తిన్నగా నడవాలంటే కూడా కుదరని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీనికి కారణం అంతవరకు ఆన్ టచ్ డ్ గా ఉన్న మర్త్యావయవాలు సెక్స్ లో పాల్గొనడంతో నలుగుతాయి. దాంతో అక్కడ కొంత వాపు. నొప్పి కలుగుతాయి. ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు రెండు, మూడు రోజులుపాటు సెక్స్ లో పాల్గొనకుండా ఉండటం మంచిది. నొప్పి ఉండటం వల్ల సెక్స్ కావాలని వాళ్ళెలాగూ కోరరు. భర్త ఆమె బాధను అర్థం చేసుకొని సానుభూతిగా రెండు రోజులు ఆగితే అతని ఎడల ఆమెకు

ప్రేమభిమానాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఆ రెండు రోజులపాటు భర్త చూపించే సహనం భవిష్యత్తులో ఆమె అందించే సహకారానికి సోపానం అవుతుంది. కొందరికి ఈ నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నొప్పి, వాపు తగ్గడానికి బిళ్ళలు వాడవలసి వస్తుంది. బిడాంజిన్ ఫోర్డ్ టాబ్లెట్స్, కాంబిఫామ్ టాబ్లెట్స్ రెండు రకాలు కూడా ఉదయం - ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి - రాత్రి ఒకటి చొప్పున రెండు, మూడు రోజులు వాడాలి. దాంతో నొప్పి, వాపు త్వరగా తగ్గిపోతాయి.

## హనీమూన్ సిస్టెటిస్

తొలికలయికల వల్ల మర్నావయాల దగ్గర బాధ అనిపించడమే కాకుండా కొందరు స్త్రీలకి మూత్రం మాటిమాటికీ రావడం, మంట అనిపించడం, పొత్తికడుపు దగ్గర బిగదీయడం, కొద్దిపాటి జ్వరం ఉంటాయి. వీటన్నింటికీ, మూలం సెక్స్ లో పాల్గొనడం వల్ల మర్నావయాల దగ్గర నలిగి కొంత ఇన్ ఫియేషన్. మరికొంత ఇన్ ఫెక్షన్ కలగడం కారణం. ఈ పరిస్థితినే హనీమూన్ సిస్టెటిస్ అంటారు.

బాక్టీరియా క్రిములు మూత్రనాళం ద్వారా మూత్రకోశంలోకి చేరి మంట, నొప్పి, జర్వం కలగజేస్తాయి. మూత్రకోశంలోకి చేరిన ఈ బాక్టీరియా క్రిములు భర్త నుంచి సంక్రమించడం కాదు. సహజంగానే మర్నావయాల దగ్గర స్తబ్ధతగా ఉన్న బాక్టీరియా క్రిములు ఇన్ ఫెక్షన్ కలగజేయడానికి కారణం కావచ్చు.

చాలామంది ఇలా కలిగిన ఇన్ ఫెక్షన్ కొత్తగా పెళ్లై నిద్రలేకుండా రాత్రిళ్ళు గడపడం వల్ల వేడి చేసిందని అనుకొని - చలవ చేయడానికని పండ్ల రసాలు, నిమ్మకాయ నీళ్ళు కొబ్బరి బొండాం నీళ్ళు తీసుకుంటారు. ఏమి తీసుకున్నా, తీసుకోకపోయినా చాలా మందిలో మూడు, నాలుగు రోజులలోనే హనీమూన్ సిస్టెటిస్ తగ్గిపోతుంది. కొందరికి మూత్రం నొప్పి, మంట, కడుపు బిగదీయడం, జ్వరం ఉంటాయి. వారికి చికిత్స అవసరం అవుతుంది.

తొలి కలయికల వల్ల కలిగిన బాధలు తొలగడానికి నార్ బాక్టిస్-400 బిళ్ళలు ఉదయం - ఒకటి, రాత్రి - ఒకటి చొప్పున వారం రోజులు వాడాలి. మూత్రం మంట తగ్గడానికి యురిస్టాస్ బిళ్ళలు ప్రతి ఆరు గంటలకి ఒకటి - రెండు చొప్పున నాలుగైదు రోజులు వాడాలి. నొప్పి తగ్గడానికి కాంబిఫ్లామ్ బిళ్ళలు తడవకి ఒకటి చొప్పున రోజుకి మూడుసార్లు నొప్పి తగ్గేవరకు వాడాలి. మర్నావయాల దగ్గర వాపు అనిపిస్తే త్వరగా తగ్గడానికి బిడాంజిన్ ఫోర్ట్ బిళ్ళలు ఉదయం - ఒకటి, మధ్యాహ్నం - ఒకటి, రాత్రి - ఒకటి చొప్పున నాలుగైదు రోజులు వాడాలి.

**మొదటి కలయిల్లో బాధలు స్త్రీలకే కాదు పురుషులకీ ఉంటాయి.**

స్త్రీలల్లో లాగానే పురుషుల్లో కూడా మొదటిరాత్రి సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు పురుషాంగం ఒరుసుకుపోవడం, మంట పుట్టడం ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు పురుషులు కూడా పైన చెప్పిన మందులనే నాలుగైదు రోజులు వాడాలి. పురుషాంగం వాపు, మంట తగ్గేవరకు సెక్స్ లో పాల్గొనకుండా ఆగాలి.

తొలి కలయికల్లోని బాధలు స్త్రీలకైనా పురుషులకైనా వారం - పది రోజుల పాటే ఉంటాయి. ఆ తరువాత అవన్నీ సర్దుకుపోతాయి. ఎవరికైనా వారం - పది రోజులు దాటినా సెక్స్ లో పాల్గొంటే బాధాకరంగా ఉంటే డాక్టరుకి చూపించుకుని చికిత్స పొందడం అవసరం.

## 2. సెక్స్ భయాలు

### తొలి కలయికలోని వైఫల్యాలు

రజనీకి పెళ్లై నాలుగు వారాలైంది. ఇంతవరకు ఆమెలో అంగప్రవేశం జరగలేదు. సంయోగం కోసం భర్త ప్రయత్నించినప్పడల్లా బాధ కలుగుతోందని గోలపెట్టడంతో ప్రతిసారి మొదట్లోనే విరమించుకోవడం జరుగుతోంది. ఒక్క సెక్స్ విషయంలో తప్ప తక్కిన సందర్భాల్లో అతనంటే ఆమెకు ఎంతో ప్రేమ. అతనికి అన్నీ చేసి పెడుతుంది సినీమాలకి, షికార్లకి చెట్టపట్టాలేసుకుని హుషారుగా వెళుతుంది. తీరా బెడ్ మీదకి చేరిన తరువాత భర్త ఆమె పైకి రాగానే అమ్మో వద్దా... అంటూ తోసివేస్తుంది. భర్త అంటే అంత ప్రేమగా ఉండే ఆ రజనీయేనా అన్నంత అనుమానం కలుగుతుంది. భర్తకి ఆమె మనస్తత్వం అంతుపట్టకుండా అయింది. అందుకనే ఓ రోజున రజనీని తీసుకుని భర్త ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. గడిచిన నాలుగు వారాల విషయాన్ని వివరించాడు.

డాక్టర్ నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను. ఆమె కన్నెపార దళసరిగా ఉండి సంయోగం కుదరకుండా అవుతోందా? అందువల్లే ఆమె నొప్పి కలుగుతోందా? అని చాలా అమాయకంగా అడిగాడు.

అతని అనుమానం ఎంతవరకు నిజమో అని రజనీని పరీక్ష చేస్తే కన్నెపార ఏ మాత్రం దళసరిగా లేదు. పైగా కన్నెపార చిరిగే ఉంది. ఈ నాలుగు వారాలు సెక్స్ కి ప్రయత్నించడంలో ఎప్పడో చిరిగిపోయింది.

### దళసరైన కన్నెపార చాలా అరుదు.

చాలామందిలో మొదటి కలయిక జరగకపోవడానికి కన్నెపార దళసరిగా ఉండటం కారణమనే అపోహ ఉంది. కాని ఎక్కడో ఎవరికో తప్ప కన్నెపార దళసరిగా ఉండటం జరగదు. కన్నెపార సెక్స్ కి అడ్డుకోవడమనేది చాలా అరుదు.

ఇంజక్షన్ అంటే భయంతో ఎంతో మంది బిగుసుకుంటారు. అలాగే ఎందరో స్త్రీలల్లో అంగప్రవేశం బాధ కలిగిస్తుందనే భయం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. తాము ఏ కాస్త నొప్పినైనా తట్టుకోలేమని అనుకొంటారు. మనసులో సెక్స్ కావాలనే ఆరాటం ఉన్నా అసలు సమయానికి భయం కలిగి బిగుసుకుపోవడం జరుగుతుంది.

భర్త అంగప్రవేశం కొరకు ప్రయత్నిస్తున్న కొద్దీ యోని దగ్గర కండరాలు మరింత బిగుసు కుంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితిని వజినీస్ మస్ అంటారు. ఇది కేవలం భయం వల్ల కలిగేదే తప్ప శారీరకంగా అక్కడ మొదట్నుంచి ఏదో అవరోధం ఉండటం కాదు.

సాధారణంగా సెక్స్ పరంగా ప్రేరణ పొందితే యోని దగ్గర ద్రవాలు ఊరతాయి. అంతే కాకుండా సెక్స్ పరంగా ప్రేరణ పొందినప్పుడు యోని దగ్గర కండరాలు బిగుతు సడలుతాయి. దాంతో అంగప్రవేశం సులువుగా జరిగిపోతుంది. మనసులో సిగ్గు, జంకు, భయంల లేనప్పుడు భర్త చేసే ఫోర్స్ లతో కామప్రేరణ చక్కగా కలుగుతుంది. దాంతో అంగప్రవేశం ఎటువంటి బాధలేకుండా జరుగుతుంది. చక్కని తృప్తిని, హాయిని కలిగిస్తుంది. ఒకవేళ మొదటి కలయిక కొంత నొప్పి అనిపించినా రెండవ కలయిక ఎటువంటి బాధా ఉండదు.

## సహకారం - సంయోగం

మొదటి కలయిక తృప్తికరంగా జరగాలంటే భార్య సహకారం చాలా అవసరం. మనసులు ఒకటై కాగిలింతలతో మైమరిచి మత్తుగా మారితే అంతా సుఖప్రదంగా జరిగిపోతుంది. కొందరు స్త్రీలలో పెళ్లై ఎంతకాలమైనా సంయోగమే జరగదు. దానికి కారణం భార్య సరిగ్గా సహకరించకపోవడమే. ఒకవేళ సహకరించినట్లు అనిపించినా ఆమెలో సెక్స్ పరంగా స్పందన కలగకపోవడమే.

సెక్స్ పరంగా స్త్రీ స్పందించనప్పుడు యోని డ్రైగానే ఉంటుంది. యోని డ్రైగా ఉన్నప్పుడు అంగం పూర్తిగా లోనికి ప్రవేశించదు. ఒకవేళ అంగప్రవేశం జరిగినా యోని లోపల పొడిగా ఉండటంతో మంట అనిపిస్తుంది. దాంతో ఆమె సెక్స్ కి సహకరించకుండా అవుతుంది.

## 3. సెక్స్ అపోహలు - వాస్తవాలు

**హస్త ప్రయోగం ఆరోగ్య లక్షణమే కాని హానికరం కాదు.**

యుక్తవయస్సు వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ౨౭ నుంచి ౩౮ శాతం పురుషులలో హస్త ప్రయోగం అలవాటు ఉంటుంది. హస్త ప్రయోగం అప్పుడప్పుడు చేసేవాళ్ళూ ఉంటారు. రోజూ చేసేవాళ్ళూ ఉంటారు. ఒకేరోజులో పలుమార్లు చేసేవాళ్ళూ ఉంటారు. హస్తప్రయోగం చేయనివాళ్ళూ ఎవరూ ఉండరు.

ఎవరైనా మేము ఎప్పుడూ హస్తప్రయోగం చేయలేదని అంటే వాళ్ళలో ఏదన్నా లోపం ఉందేమో పరీక్షించాలి. మెంటల్ రిటార్డేషన్ (మానసిక ఎదుగుదల లేనివాళ్ళు) సెక్స్ హారోన్సు లోపం, మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళల్లో సెక్స్ పరమైన కోరికలు కలగవు. సెక్స్ పరమైన కోరికలు కలగనప్పుడు హస్తప్రయోగం చేయాలని ఉండదు.

హస్తప్రయోగం చేయడం సెక్స్ పరంగా అతనిలో మానసిక పరిపక్వత వచ్చిందనడానికి చిహ్నం. ఆకలి వేస్తే అన్నం తినడం ఎంత సహజమో, యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత సెక్స్ కోరికలు కలిగి హస్తప్రయోగం చేయడం అంతగానే సహజం.

## హస్త ప్రయోగం గురించి అర్థంలేని అపోహలు

హస్త ప్రయోగం చేస్తే వీర్యనష్టం కలిగి మనిషి నీరసించి పోతాడని, నరాలు దెబ్బతింటాయని, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుందని, కంటి చూపు తగ్గుతుందని, పెళ్లికి పనికిరారని, అంగం పటిష్టంగా నిలబడదని, ఆయుష్షు తగ్గిపోతుందని - ఇలా ఎన్నో అపోహలు, అనుమానాలు సమాజంలో ప్రబలి ఉన్నాయి. ఏండ్ల కొలది ఇటువంటి అపోహలు, అనుమానాలు సమాజంలో ఉంటూ వస్తున్నాయి. ఈ అనుమానాలు, భయాలు అన్నీ అర్థంలేనివే, అశాస్త్రీయమైనవే.

వీర్యం ఎంత పోయినా మనిషి నీరసించడు. వీర్యం ఏమాత్రం బలవర్ధక పదార్థం కాదు. బలవర్ధక పదార్థాల నుంచి వీర్యం తయారు కాదు. అందువల్ల వీర్యం పోతే బలవర్ధక పదార్థం దీని కోసం వృధా అయిందని అనుకోనవసరం లేదు. ఒక వీర్యం బొట్టు వంద రక్తపు బొట్లతో సమానమని ఒక అపోహ ఉంది. వీర్యం ఏ మాత్రం విలువైనది కాదు కనుక ఇది అర్థంలేని మాట. వంద రక్తపు బొట్లు కలిసి ఒక వీర్యపు బొట్టుగా మారడమనేది కూడా జరగదు.

## వీర్యం తయారీ

వీర్యం అనేది ముఖ్యంగా రెండు భాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఒకటి- వీర్య కణాలు, రెండు - తెల్లని ద్రవం. వీర్యకణాలు వృషణాల (టెస్టికల్స్) నుండి ఉత్పత్తి అవుతాయి. మొత్తం వీర్యకణాల రాశి ఒక శాతం మాత్రమే. తక్కిన 99 శాతం కేవలం తెల్లని ద్రవం.

వీర్యానికి సంబంధించిన ద్రవం ముఖ్యంగా ప్రోస్టేటు గ్రంథి నుంచి తయారవుతుంది.

## వీర్యం అంటే

ప్రోస్టేటు గ్రంథితోపాటు శుక్రకోశాలు కూడా కొంత ద్రవాన్ని తయారు చేస్తాయి. అలాగే కౌపర్స్ గ్రంథులు కూడా కొద్దిగా ద్రవాన్ని తయారు చేస్తాయి. అయితే శుక్రకోశాలు, కౌపర్స్ గ్రంథులు తయారుచేసే ద్రవం చాలా తక్కువ. ప్రోస్టేటు గ్రంథి విడుదలచేసే ద్రవం చాలా ఎక్కువ. ప్రోస్టేటు గ్రంథి, శుక్రకోశాలు, కౌపర్స్ గ్రంథి విడుదలచేసే ద్రవాలలో కొన్ని రసాయనాలు వుంటాయి. శరీరంలో అన్ని ద్రవాల్లో ఉండే విధంగానే వీటిల్లోనూ ఈ రసాయనాలు ఉంటాయి. అంతుతప్ప అవి ప్రత్యేకమైనవీ కావు. ఎక్కువ శాతమూ కాదు.

వీర్యంలో ఉండే రసాయనకాలు వేరే ఇంకేమీ కాదు. ఆల్బుమిన్, ఫాస్ఫరస్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం ఫాస్ఫేట్, ఆక్సిడే, సెమినల్ గ్రాన్యుల్స్, ఎమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి అతి సాధారణమైనవి.

వృషణాల్లో తయారైన వీర్యవాహికల ద్వారా పాకుకుంటూ శుక్రకోశాల దాకా వస్తాయి. అక్కడినుంచి పురుషాంగం ద్వారా స్థలింపబడటానికి చేయూత కావాలి. శుక్రకోశాల్లోనూ, ప్రోస్టేటు గ్రంథిలోనూ తయారయ్యే ద్రవం వీర్యకణాలని ఎక్కువ సంఖ్యలో ఒక్కసారిగా బయటకు నెట్టడానికి తోడ్పడుతుంది.

## వీర్యం విడుదల

శుక్రకోశాలదాకా చేరిన వీర్యకణాలు అక్కడే ఆగుతాయి. ఆపైన బయటకు రావడానికి ప్రత్యేక పరిస్థితులు కావలసిందే. ఆ ప్రత్యేక పరిస్థితే - సెక్స్ యాక్ట్ మనిషిలో సెక్స్ ప్రేరణ కలగగానే వృషణాల దగ్గరనుంచి శుక్రకోశాలు, ప్రోస్టేటు గ్రంథి వరకు అలజడి మొదలవుతుంది. అవన్నీ ఎలర్ట్ అయిపోతాయి. చకచకా యాక్షన్ లోకి వచ్చేస్తాయి.

సెక్స్ కైమాక్స్ కి చేరగానే నాడీ యంత్రాంగం పై ఫ్రీక్వెన్సీలో స్టిమ్యులేషన్ ఇవ్వగా వీర్యవాహికలు, శుక్రకోశాలు, ప్రోస్టేటు గ్రంథి ఒక్కసారిగా కాంట్రాక్టు అవుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రోస్టేటు గ్రంథి నిమ్మకాయ పిండబడినట్లు స్క్విజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారిగా ఈ ద్రవం గోదావరి వెల్లువలాగా వీర్యకణాలని కలుపుకుని స్థలింపబడుతుంది. అదే వీర్యస్థలనం.

కలిగిన సెక్స్ కోరిక, సెక్స్ ప్రేరణను బట్టి ప్రోస్టిటు గ్రంథి స్క్వీజ్ అవడం (ముడుచుకోవడం) వుంటుంది. సెక్స్ కోరిక, ప్రేరణ ఎక్కువ వుంటే నరాల ఉద్రిక్తతతో ప్రోస్టిటు గ్రంథి ఎక్కువగా స్క్వీజ్ అయి ఎక్కువ ద్రవం స్థలిస్తుంది. ఒకసారి ప్రోస్టిటు గ్రంథి స్క్వీజ్ అయిన తరువాత తిరిగి అందులోని గ్రంధులు యాక్టివ్ అయి ద్రవాన్ని తగినంత తయారుచేయడానికి కొన్ని గంల వ్యవధి పడుతుంది.

**హస్తప్రయోగం చేసినవారిలో అంగస్తంభన వైఫల్యం**

హస్త ప్రయోగం చేయడం వల్ల అంగం పటిష్టత కోల్పోవడం, అంగం మెత్తబడి పోవడం, సెక్స్ లో పాల్గొనకపోవడం జరగనే జరగదు. కాని కొందరు హస్త ప్రయోగం గురించి అనవసరంగా ఆందోళన చెందతారు. సెక్స్ విషయంలో ఏ మాత్రం భయం ఉన్నా, ఆందోళన ఉన్నా సెక్స్ చేయలేమనే పిరికితనం ఉన్నా, ఏదో తప్ప జరిగిపోయిందనే అపరాధ భావం ఉన్నా అంగం సరిగ్గా స్తంభించదు. ఒకవేళ స్తంభించినా మధ్యలోనే అంగం మెత్తబడుతుంది. దీనినే సెక్సువల్లీ రిలేటెడ్ యాంక్రెజటి అంటారు.

తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మనసులో అంతర్లీనంగా ఏ మాత్రం అనుమానం ఉన్నా రతిలో పాల్గొన్నప్పుడు అంగం డౌన్ అవుతుంది. అందుకని హస్త ప్రయోగం ఏ మాత్రం తప్పకాదని దాని వల్ల సెక్స్ బలహీనత కలగదని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. మనసులో నించి అర్థం పర్థంలేని అనుమానాలని, భయాలని పూర్తిగా తొలగించుకోకపోతే అంగస్తంభన వైఫల్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. సెక్స్ విజ్ఞానం లేకపోవడం వల్లనే శరీరంలో ఏ బాధ కలిగినా ఏ తేడా వచ్చినా హస్త ప్రయోగం వల్ల, వీర్య నష్టం వల్ల అని అనుమానపడటం, భయపడటం జరుగుతుంది. ఆ భయమే వారి అంగస్తంభన వైఫల్యానికి కారణమవుతుంది. అంతే తప్ప హస్త ప్రయోగం కారణం కానే కాదు.

## నకిలీ సెక్స్ స్పెషలిస్టులు - కాలం చెల్లిన సిద్ధాంతాలు

కొందరు సెక్స్ స్పెషలిస్టులమని ప్రచారం చేసుకుంటూ హస్త ప్రయోగం వల్ల, వీర్య నష్టం వల్ల పెళ్ళికి పనికి రాకుండా అవుతారని జనాలని భయపెడుతూ ఉంటారు. ఏవేవో మందులిస్తూ డబ్బులు దోచేస్తూ ఉంటారు. వాస్తవానికి ఇలా చెప్పే వాళ్ళు ఎవరూ నిజమైన సెక్స్ స్పెషలిస్టులు కానే కాదు. వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ మోసపు మాటలే. సెక్స్ విజ్ఞానం లేనివారి అమాయకత్వాన్ని, అజ్ఞానాన్ని సామ్ను చేసుకునేవాళ్ళే.

కొందరు దేశీయ వైద్యం పేరిట ప్రాచీన గ్రంథాలలో హస్త ప్రయోగం హీనికరం అని, వీర్యం ఎంతో విలువైనది, వీర్యం పోతే మనిషి సెక్స్ పరంగా బలహీనవుతాడని రాసి ఉందని చెడుతూ జనాలని భయపెడుతూ అర్థంలేని వూడ్కాలన్నీ చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పే మాటలన్నీ అశాస్త్రీయమైనవే.

ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానం హస్త ప్రయోగం ఏ మాత్రం హీనికరం కాదని పైగా ఆరోగ్య అక్షణమని, వీర్యం ఏ మాత్రం విలువైనది కాదని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషణ చేసి నిరూపించింది అయినా ప్రాచీన వైద్య గ్రంథాలలో ఏదో రాసుందని అది నమ్మమని చెప్పడం హాస్యాస్పదం.

పూర్వకాలం భూమి బల్లపరుపుగా ఉందనుకునే వాళ్ళు సూర్యుడు తూర్పుని బయలుదేరి పడమరకి ప్రయాణం చేస్తాడని అనుకునేవారు కాని అభివృద్ధి చెందిన సైన్స్ అవన్నీ తప్పని రుజువు చేసింది. వాస్తవం ఏమిటో ఈనాడు అందరికీ తెలుసు. అదే విధంగా ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానం ఎన్నో పాత అభిప్రాయాలని తప్పని రుజువు చేసి చూపించి ఏది నిజమో నిర్ధారణ చేసింది. ఇంకా కొందరు కాలం చెల్లిన భావాలని, అశాస్త్రీయమైన వాటిని పట్టుకుని వాటినే నిజమనుకోవడం వట్టి మూర్ఖత్వం.

## వీర్యం చిక్కన - సెక్స్ సామర్థ్యం

చాలామంది వీర్యం చిక్కగా ఉంటే సెక్స్ పరంగా బలంగా ఉన్నట్లు వీర్యం పలచగా ఉంటే సెక్స్ పరంగా బలహీనత ఉన్నట్లు భావిస్తారు. వీర్యం చిక్కగా ఉన్నా, పలచగా ఉన్నా ఒక్కటే.

వీర్యం చిక్కగా ఉండటం కోజమని కొందరు దేశీయ వైద్యులు, నాటు వైద్యులు ఏవేవో మందులు ఇస్తారు. వీర్యం పలచగా ఉంటే సెక్స్ లో తగినంత ఎంజాయ్ మెంట్ కలగదని, స్త్రీ కూడా ఆ పురుషుని వల్ల తృప్తి చెందదని కల్లబొల్లి కబుర్లు అనేకం వినిపిస్తారు. అలాగే వీర్యం పలచగా ఉంటే సంతానం కలగదని భయపెడతారు.

వీర్యం పలచగా ఉన్నా చిక్కగా ఉన్నా స్త్రీకి ఒకటే విధంగా తృప్తి కలుగుతుంది. పురుషునికి కూడా వీర్యం పలచగా ఉన్నా, చిక్కగా ఉన్నా ఒకే విధంగా తృప్తి కలుగుతుంది.

## అంగపరిమాణం - సెక్స్ తృప్తి

స్త్రీకి సెక్స్ లో తగిన తృప్తి కలగాలంటే అంగ పరిమాణం పెద్దదిగా ఉండాలనే అభిప్రాయం ఎందరిలోనో ఉంది. స్త్రీకి రతిలో తృప్తి కలగడానికి అంగ పరిమాణానికి సంబంధం లేదు. అందరి పురుషుల అంగ పరిమాణం దాదాపు ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. మామూలు సమయంలో రెండు నుంచి నాలుగు అంగుళాలు ఉంటుంది. అయితే అంగం స్తంభించినప్పుడు దాదాపు అందరికీ ఒకటే పరిమాణం ఉంటుంది.

కొన్ని కారణాల వల్ల కొందరిలో అంగ పరిమాణం తక్కిన వారికంటే చాలా చిన్నదిగా ఉన్నా సెక్స్ తృప్తి కలగడంలో స్త్రీలో ఎటువంటి తేడా రాదు. స్త్రీకి సెక్స్ లో తృప్తి కలగడానికి అంగ పరిమాణం ఎంత ఉందనేది ప్రధానం కాదు. స్త్రీకి సెక్స్ లో సుఖప్రాప్తి కలిగేవరకు అంగస్తంభన ఉండటం, రతిని కొనసాగించటం ప్రధానం..

స్త్రీకి కామనాడులు యోనిలో ఒకటిన్నర అంగుళం వరకే ఉంటాయి. అంతకంటే లోపలికి కామనాడులు ఉండవు. కామనాడులు అన్నీ యోని ద్వారం దగ్గర క్లైటోరిస్ లోనే ఉంటాయి. అందుకని సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే స్త్రీకి రతిలో తృప్తి కలగాలంటే స్తంభించిన పురుషాంగం మూడు అంగుళాలు ఉంటే చాలు. కావల్సిందల్లా అంగస్తంభనం చక్కగా ఉండటం, ఆమెకు సుఖప్రాప్తి కలిగేవరకు రతిని చేయగలగడం. కొందరు స్త్రీలు ఒకటి రెండు నిమిషాలలోనే సుఖప్రాప్తి పొందితే మరికొంత స్త్రీలు సుఖప్రాప్తి పొందడానికి అయిదు పది నిమిషాలు తీసుకుంటారు. స్త్రీలలో సుఖప్రాప్తి కలగడం అనేది వారికి కలిగే లైంగిక ఉద్దీపనల బట్టి, వ్యక్తుల బట్టి, పరిస్థితుల బట్టి ఉంటుంది.

## హస్తప్రయోగం - అంగ పరిమాణం

కొందరిలో హస్తప్రయోగం గురించి అర్థంలేని భయం ఉంటుంది. హస్తప్రయోగం చేస్తే అంగం చిన్నదైపోతుందని భయపడతారు. ఆ భయం వారిలో భ్రాంతి మనస్తత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది. భ్రాంతి మనస్తత్వం వల్ల అంగ పరిమాణం తగ్గకపోయినా తగ్గినట్లు ఫీలవుతారు. వారి కంటికి అలాగే కనబడుతుంది. దానికి కారణం

హస్త ప్రయోగం గురించి ఉన్న భయం, ఆందోళన కారణం. హస్త ప్రయోగం వల్ల ఎటువంటి నష్టం జరగదనే విజ్ఞానాన్ని వారికి కలిగిస్తే వారిలో భయం తొలిగిపోతుంది. భ్రాంతి మనస్తత్వం కూడా లేకుండా అవుతుంది. ఆ పైన సెక్ట్లో చక్కగా పాల్గొనగలుగుతారు.

## 4. అంగ స్తంభన వైఫల్యం - చికిత్స

### అంగస్తంభన వైఫల్యం కలగడంలో ఆంతర్యం

శారీరకంగా, మానసికంగా ఓవర్ వర్క్ చేయడం, అతిగా అలసిపోవడం, మానసికంగా ఒత్తిడి కలగడం అంగస్తంభన వైఫల్యానికి కారణం. ఇటువంటిదానికి మందు అవసరం లేదు. కంటినిండా పూర్తిగా నిద్రపోవడం ఒక్కటే మార్గం. దానితో అలసట. మానసిక ఒత్తిడి తీరుతుంది.

తేలికైన మనసు, చురుకైన సెక్స్ కి మూలం. సెక్స్ కి ఉపక్రమించే ముందు మనసు తేలికపడే విషయాలు, ఉత్తేజపలచే విషయాలే మాట్లాడాలి చదవాలి. మూడ్ ఎలివేట్ అవ్వాలి. అలాకాక మూడ్ డల్ అయితే అంగస్తంభన వైఫల్యం కలుగుతుంది.

## 5. సందేహాలు ఇంకా ఇవీ - అవీ

### వరిబీజం ఎందుకు వస్తుంది ? మందులతో తగ్గదా ?

సాధారణంగా వరిబీజం వచ్చినవారిలో వ్యషణం పరిమాణం మామూలుగానే వుంటుంది. వ్యషణం చుట్టూ నీరుచేరుతుంది.

వ్యషణం చేట్టూ నీరుచేరడానికి ఒక కారణంవుంది. వ్యషణాన్ని అంటుకుని ఒక సన్నటిపార వుంటుంది. ఈ పార నాలుగు అంచులూ వ్యషణానికి అంటుకుని మధ్యలో ఆంటీ అంటనట్లు వుంటుంది.

ఈ పార లోపల నీరుని తయారుచేసే గ్రంధులు వుంటాయి. సాధారణంగా ఈ గ్రంధులు చైతన్యరహితంగా వుండినీరుని తయారు చేయవు. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఈ గ్రంధులు యాక్టివ్ అయి నీరుని స్రవిస్తాయి. అలా స్రవించిన నీరు వ్యషణానికి దానిని అంటుకునివున్న పార మధ్య చేరుతుంది. దీనినే వరిబీజం అనీ, బుడ్డ అనీ., హైడ్రోసీల్ అనీ అంటారు.

## దోమలు కలిగించే వరిబీజం!

దోమలు కుట్టడంవల్ల ఫైలేరియా ( బోదవ్యాధి) రావడం అతిసహజం. వ్యషణాలకి కూడా ఫైలేరియా వస్తుంది. దానివల్ల వ్యషణం వాస్తుంది. వ్యషణం అలా వాచినప్పుడు కూడా దానిని అంటుకుని వున్న పొర నీరుని స్రవిస్తుంది. దానితో వరిబీజం మొదలవుతుంది. దోమలు ఎక్కువవుండే ప్రాంతాల్లో అధికశాతం ఫైలేరియా వల్లే వరిబీజం వస్తుంది.

వ్యషణానికి బాక్టీరియా క్రిములు సోకడంవల్ల వాయడం, నోప్పిచేయడం వుంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వరిబీజం తయారవుతుంది.

గనేరియావంటి సుఖవ్యాధివల్ల కొందరిలో పురుషాంగం నుంచి చీము కారడమే కాకుండా, ఆ క్రిములు వ్యషణాలకి సోకి వ్యషణాలు వాయడం, నోప్పి అనిపించడం, వరిబీజం తయారవడం జరుగుతుంది.

వ్యషణాలకి ఫైలేరియా వచ్చినా, గనేరియా సోకినా, మరొక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా పూర్తి మోతాదులో మందులువాడితే వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. వ్యాధివల్ల పెరిగిన వ్యషణం పరిమాణం తగ్గుతుంది. వరిబీజం కొంతకనబడినా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. కొందరిలోనే మందులకి లొంగకుండా వరిబీజం పెరుగుతుంది. అందుకని వ్యషణాలకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి నోప్పి, వాపు కలిగితే వెంటనే చికిత్సపొందాలి.

## ప్రతి బుడ్లవాపు వరిబీజం కాదు

అరుదుగా వ్యషణాలకి కంతులు వస్తాయి. అవి మామూలు కంతులు కావచ్చు. కేన్సర్ కంతులు కావచ్చు. వాటివల్ల కూడా వరిబీజం తయారవుతుంది. వరిబీజం వచ్చినప్పుడు కొందరు అదంతా వాపు అనుకుని భయపడతారు. కానీ పరిశీలిస్తే వ్యషణంలోని వెనుకభాగం చుతికి తగులుతుంది.

ఇది ఇలా వుండగా కొందరికి వ్యషణం మొత్తం చక్కగా తెలుజ్తంది. వ్యషణం చుట్టూ ఎటువంటి వాపు వుండదు. వ్యషణానికి పైన నిమ్మకాయంత, నారింజకాయంత వాపు తయారవుతుంది. ఇది కూడా ఒకరకమైన వరిబీజమే. వ్యషణానికి అంటుకుని వున్న పారే పైకి వుండి స్పెరమాటిక్ కార్డ్కి చుట్టుకుని వుంటుంది.

## వరిబీజాల్లో రకాలు

సాధారణంగా ఇది పూర్తిగా అంటుకుని వుంటుంది. అందుకని అక్కడ నీరు చేరడం వుండదు. స్పెరమాటిక్ కార్డ్కి పొర పూర్తిగా అంటుకుని వుండక ఖాళీ వున్నప్పుడు అక్కడ నీరు చేరుతుంది. అక్కడ వేరుగా వరిబీజం తయారవుతుంది.

కొందరికి వరిబీజం కిందనుంచి పైకి పెరిగి కనబడుతుంది. దానికి కారణం స్పెరమాటిక్ కార్డ్కి అంటుకుని వున్న పొరకింద నీరు చేరడమే. పుట్టుకతేనే వరిబీజం వున్నవారిలో పడుకుంటే బీర్ణాల్లో నీరు తగ్గుతుంది. కూర్చుంటే, నించుంటే బీర్ణాలు ఉబ్బుతాయి. వీరిలో వరిబీజం హెర్నియా కేడా వుండే అవకాశం వుంది.

సాధారణంగా వరిబీజం ప్రమాదం కాదు. వరిబీజం మరీ వెద్దది అయితే బీర్ణాలమీద చర్మం సాగిపోవడం,

అనారోగ్యంగా మారడం జరుగుతుంది. పుండు పడుతుంది. కొందరిలో వరిబీజం లోపల రక్తం చేరుతుంది.

వరిబీజం వున్నప్పుడు కొందరు సూది వేసి నీరు తీస్తారు. అత్యాలికంగా పరిమాణం తగ్గినా తిరిగి నీరు చేరుతుంది. పైగా సూది వేయడంవల్ల సెప్టిక్ అయ్యే అవకాశం వుంది. అందుకని విరిబీజానికి ఆపరేషన్ ఒక్కటే సరైన పద్ధతి. వరిబీజం ఆపరేషన్ చాలా సులువైనది.

### 6. పురుషాంగం పూర్వచర్తం మూసుకుని ఉంటే...

పురుషాంగం పూర్వచర్తం బిగుతుగా వున్నవారు రతిలో పాల్గొన్నప్పుడు శిశ్నం వెనుకకి వెళ్ళి పట్టేయడం, నొప్పి కలిగి అంగస్తంభనం వైఫల్యం కలగడం జరుగుతుంది.

ఒక్కొక్కసారి అలా వెనుకకి వెళ్ళిన చర్తం ముందుకు రాక బిగుసుకుపోయి లింగులాగా ఉబ్బిపోతుంది. శిశ్నం కూడా తగిన రక్తప్రసరణ జరగక వాచిపోతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిని పారాఫైమోసిస్ అంటారు.

పురుషాంగం పూర్వచర్తం బిగుతుగా వున్న పరిస్థితిని పైమోసిస్ అంటారు. పైమోసిస్ వున్నవారు ముందుగానే గుర్తించి సున్నీ చేయించుకోకపోతే రతిలో నాల్గొన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా చీరుకుపోయి బాగా రక్తం కారిపోయే ప్రమాదం వుంది.

పైమోసిస్ ( పురుషాంగం పూర్వచర్తం శిశ్నం పై మూసుకునిపోయిన పరిస్థితి) ముఖ్యంగా రెండురకాలుగా వుంటుంది. ఒకటి-శిశ్నం పై పూర్తిగా మూసుకుపోయి అసలు ఏమాత్రం వెనుకకి కదలకపోవడం. రెండు - బిగుతుగా శిశ్నం వెనుకకి కదలడం.

### **పుట్టుకతోనే పురుషాంగ పూర్వచర్తం మూసుకుని ఉంటుందా ?**

సాధారణంగా పురుషాంగం పూర్వచర్తం మగపిల్లవానికి 2-3 సంవత్సరాలు నిండేవరకు శిశ్నానికి అంటుకుని కదలకుండా వుంటుంది. ఆ తరువాత వెనుకకి లాగితే తేలికగా వెనుకకి వస్తుంది. 2-3 సంవత్సరాలు నిండిన తరువాత కూడా చర్తం తేలికగా వెనుకకి కదలడం లేదంటే పైమోసిస్ పరిస్థితి వుందనుకోవచ్చు.

మామూలుగా 2-3 సంవత్సరాల ముందు వయస్సులో కూడా కొబ్బిపాటి నొప్పితో పురుషాంగం పూర్వచర్తం వెనుకకి గుంజడం వీలు అవుతుంది. మొదట్లో నొప్పి కాస్త అనిపించినా ఆ తరువాత వుండదు.

కొందరికి పురుషాంగం పూర్వచర్తం శిశ్నాన్ని పూర్తిగా మూసి వుంచుతుంది. సూదిబెజ్జిమంత వుంటుంది. దాంట్లోనుంచి మూత్రం వస్తుంది. కొందరికి ఆ బెజ్జిం కూడా మలీ చిన్నదిగా వుండి మూత్రవిసర్జన సమయంలో బోలూన్ లాగా ఉబ్బుతుంది. మూత్రం విసర్జన అధిక సమయం తీసుకుంటుంది. ఇటువంటప్పుడు వుంటనే సున్నీచేయాలి.

పుట్టుకతోనే పురుషాంగం పూర్వచర్తం బిగుతుగా వుందో, మూసుకునిపోయి వుందో ఇబ్బంది కలగడం వుండగా కొందరికి మొదట్లో లేక తరువాత చర్తం బిగుసుకుపోవడం జరుగుతుంది. మాటిమాటికీ పురుషాంగానికి వ్యాధులు రావడం, శిశ్నం పుండుగా మారడం, పురుషాంగం పూర్వచర్తం వాచడం ఇందుకొక ప్రధాన కారణం. షుగర్ వ్యాధి వచ్చినవారికి కూడా నిదానంగా పురుషాంగం పూర్వచర్తం బిగుసుకుపోవడం జరుగుతుంది.

చర్చం బిగుజుకుపోవడంతో చర్చంమీద గాళ్ళులాగా ఏర్పడటం, పుండు అవడం, రతిలో పాల్గొంటే మరింత చిట్టడం వుంటుంది. అందుకొని అంతకుముందు లేనిది పురుషంగం పూర్వచర్చం పుండుగా మారడం, బిగుతుగా మారడం జరిగితే షుగర్ వుందేమో అనుమానించి బ్లడ్ షుగర్ పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

## బిగుతుగా మారే పురుషాంగ పూర్వచర్చం

పురుషాంగం పూర్వచర్చంకింద ఏమైనా కంతులు ఏర్పడినా, పుండ్లు ఏర్పడినా చర్చం బిగుతుగా అవుతుంది.

చిన్నపిల్లల్లోనైనా, పెద్దవాళ్ళలోనైనా చర్చం ఎప్పుడూ శిశ్నాన్ని మూసివుంచితే దానికింద క్రిముల చేరి పుండుగా మారడం జరుగుతుంది. దానివల్ల పురుషాంగం దురద అనిపించడం, చీముకారడం, పురుషాంగం వాచడం వుంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితి గమనించగానే యాంటిబయాటిక్ మందులు వాడి ఇన్ ఫెక్షన్ తగ్గగానే సున్నీ చేయించుకోవాలి.

శిశ్నంమీద చర్చం బిగుతుగా వున్నా, తరచు శిశ్నం ఏదో ఒకవ్యాధికి గురి అవుతున్నా, చర్చం శిశ్నం వెనుకకివెళ్ళి ముడతపడినా సున్నీ చేయించుకోవాలి. అలాగే బిగుతుగా మారినా, పుండుపడినా సున్నీ చేయాలి. బిగుతుగా మారిన చర్చం మందులెంత వాడినా పూర్తిగా మామూలు అవడం వుండదు. ఎప్పుడో కప్పుడు సమస్య ఎదురవుతుంది.

## ఏ వయసు వారికైనా సున్నీ చేయవచ్చా ?

సున్నీ చేయడానికి వయసుతో పనిలేదు. చంటిపిల్లవానికి పుట్టుకతోనే చర్చం పూర్తిగా మూసేసి వుండి మూత్రం రావడం ఇబ్బందిగా వుంటే రోజుల బిడ్డే అయినా సున్నీ చేయాలి. సున్నీ చేయబడిన పురుషులకి పురుషాంగం కేన్సర్ రావడం తక్కువ. అలాగే వారి భార్యలకి గర్భాశయ కేన్సర్ రావడం చాలా తక్కువ. దీనికి కారణం వారికి శిశ్నందగ్గర పాచి పేరుకొనకపోవడమే. సున్నీ చేయించుకోని వారిలో పురుషాంగం పూర్వచర్చం కింద స్కెగ్నా (పాచి) తయారవుతుంది. ఈ పాచికి కేన్సర్ ని కలిగించే గుణం వుంది. అందుకని ఆరోగ్య లిత్త్యా కూడా సున్నీ ఎంతో మంచిది.

## 7. మగువైనప్పటికీ మగవానిపై మనసు కలగదు. ఎందుకని ?

సెక్స్ కోరికలేని స్త్రీలు మూడురకాలుగా వుంటారు. ఒకరకం స్త్రీలలో కోరికా వుండదు, సెక్స్ లో ఎటువంటి స్పందనా వుండదు. అందుకని సెక్స్ వద్దంటారు.

రెండవ రకం స్త్రీలలో సెక్స్ కోరిక వుండనే వుండదు. ఆ ఆలోచనే రాదు. కానీ బెడ్ మీద భర్తకరపేరణ కలిగిస్తే ఉబ్రిక్తత చెందడం, సుఖప్రాప్తి పొందడం జరుగుతుంది ఇటువంటి స్త్రీలు తమంతటతాము సెక్స్ విషయంలో ఆసక్తి చూపరు.

మూడవ రకం స్త్రీలు సెక్స్ కావాలని కోరరు. కోరికా కలగదు. భర్త ఫోర్స్ తో సెక్స్ లో పాల్గొంటే కొద్దిగా స్పందనలు కలుగుతాయి. అంతేతప్ప ఆర్గజం (సుఖప్రాప్తి) పొందరు. ఇటువంటి స్త్రీలు శరీరానికి మనసెకీ మధ్య కనెక్షన్ కట్ అయిపోయిందని అంతా బ్లాంక్ అంటారు. కోరికలేకుండా, సుఖప్రాప్తి కలగకుండా ఇక సెక్స్ యాక్ట్ ఎందుకంటారు.

స్త్రీలలో సెక్స్ కోరిక లేకపోవడానికి అనేక కారణాలు వున్నాయి. కొన్ని తేలికగా తెలుసుకోగలిగేవి అయితే మరికొన్ని సైకో ఎనాలసిస్ చేస్తే తప్ప అంతుపట్టవు.

## తల్లి కొంగుచాటు పిల్లలు సెక్స్ లేని స్త్రీలవుతారా ?

సెక్స్ వాంఛలేని ఎందరో యువతులు తల్లి కొంగుచాటు బిడ్డలవుతారు. వయసువచ్చినా వారిలో బాల్యప్రవృత్తి పోదు. అమ్మా నాన్నల చుట్టేవారి ఆలోచనలు పరిభ్రమిస్తూవుంటాయి. తల్లితండ్రుల నీడ వదలాలంటే భద్రతారాహిత్యాన్ని ఫీల్ అవుతారు. ఏమో ఏమవుతుందోనని ఆందోళనకి లోను అవుతారు.

సెక్స్ కోరిక లేకపోవడానికి ముఖ్యంగా యాంర్జయిటీ (ఆందోళన) కారణమని చెప్పకోవచ్చు. యాంర్జయిటీ వల్ల వారిలో సెక్స్ ఆలోచనలు కలుగవు. ఏదో భయం వారిని ఆవహిస్తుంది. అంతర్లీనంగా వున్న భయం భర్తకి చేరువకాకుండా చేస్తుంది. అతనితో మనసు పంచుకోవడానికి అంగీకరించకుండా వుంటుంది. మనసు ఏ మాత్రం రాజీపడినా తాను ఆపదలో పడతానని అనుకుంటుంది. దానితో వారిలో మొదటినుంచీ సెక్స్ లో ఆలోచన లేకుండా పోతుంది.

## కొత్త వధువులో భర్తమీద ప్రేమని పెంచడమెలా ?

ఇటువంటి ఆడపిల్లల విషయంలో తల్లితండ్రులనుంచి దూరంచేయకుండా వుంచాలి. భర్త సెక్స్ కోసం ఆరాటం చూపకుండా ప్రేమనిపించుతూ తానుకూడా తల్లితండ్రులతో సమానంగా ప్రేమనిపించగలననే నమ్మకాన్ని కలిగించాలి. ఏ మాత్రం తొందరపాటు జరిగినా విశ్వాసం సడలిపోతుంది. అందుకని ఎటువంటి తొందరపాటు పనికిరాదు. ఏ విధంగానూ కించపరచడం, నిందించడం కూడదు.

అతనిమీద విశ్వాసం కలిగిన తరువాత నిదానంగా ఆమెలో సెక్స్ వాంఛ కలుగుతుంది. అయితే ఆ సెక్స్ వాంఛ ఆచితూచి కలుగుతుంది. బలవంతం చేస్తే బెడిసిగొడుతుంది. దీనికంతటికీ కారణం పెరగని బాల్యప్రవృత్తి, పెరగని మనస్తత్వమే.

కొందరు ఆడపిల్లలు చిన్నతనంలోనే బలవంతంగా సెక్స్ కి గురి అవుతారు. దానితో వారి మనసు సెక్స్ విషయమై విరక్తి పెంచుకుంటుంది. చిన్నతనంలో ఎదురైన చేదు అనుభవంవారిలో సెక్స్ వాంఛ లేకపోవడానికి కారణమని వారూ తెలుసుకోరు. సైకోఎనాలసిస్ చేసినప్పుడు మూలకారణం బయటపడుతుంది. నిదానంగా వారిలోని ఏహ్యభావాన్ని తొలగిస్తే సెక్స్ వాంఛ తలెత్తుతుంది.

## చిన్నతనంలోనే పెళ్ళి స్త్రీలో సెక్స్ వినాశిని

యువతుల్లో కొందరికి ఆలస్యంగా సెక్స్ ఆలోచనలు ప్రారంభమవతాయి. వారు ఆశించి జీవితభాగస్వామి గురించి కొన్ని ఆశలు వుంటాయి. అవి పూర్తి రూపం సంతరించుకోకుండానే వారి వివాహమైపోతుంది. వారు ఆశించే గుణగణాలు, రూపాలు భర్తలో కనబడనప్పుడు అప్ సెట్ అవుతారు. దానితో వారిలో సెక్స్ కోరిక చిగురించకుండానే మొదట్లోనే వడలిపోతుంది. ఒకరిని ఆరాధించి, మరొకరిని వివాహమాడిన సంఘటనల్లో లైంగికవాంఛ లేకుండాపోతుంది. కొందరికి ప్రిఫ్రీనియా, డిప్రెషన్ వంటి మానసికవ్యాధులు వుంటాయి.

ఇటువంటప్పుడు కూడా సెక్స్ కోరిక లేకుండాపోవచ్చు. కొందరిలో బుద్ధిమాంద్యం వుంటుంది. వీరిలో కూడా సెక్స్ కోరిక వుండదు. ఇటువంటి మానసిక అనారోగ్యం వున్నవారికి తగిన చికిత్స చేస్తే సెక్స్ కోరిక మామూలుగా కలగవచ్చు.

అండాశయాలు, కాలేం వ్యాధి గ్రస్తమైనవారిలోనూ, దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడేవారిలోనూ సెక్స్ కోరికలు లేకపోవచ్చు.

ధైర్యం లోపం వున్నవారిలో, మరికొన్ని వినాశ గ్రంథుల వ్యాధుల్లో రక్తపోటుకి, మానసిక వ్యాధులకి కొన్ని రకాల మందులు వాడేవారిలో సెక్స్ కోరిక లేకుండా ఆపవచ్చు.

స్త్రీలో సెక్స్ కోరిక లేనప్పుడు ఆమెను మాత్రమే తప్ప పట్టడం పద్ధతి కాదు. కుటుంబ పరిస్థితులని, భర్త ప్రవర్తనని కూడా గమనించాలి.

ప్రతి ఒక్కరికీ సైకో ఎనాలిసిస్ తో సమస్య పరిష్కారం కాదు, సెక్స్ కోరిక కటగడం వుండదు. ప్రేమతో ఆమెకు చేరువకావడం, ఆమె మనసుని జయించడం అవసరం. కుటుంబం గురించి, దాంపత్యం గురించి సరైన అవగాహన పెంపొందించడం, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సమస్యను కనుగొని పరిష్కరించడం చేస్తే సెక్స్ కోరికలు కలిగే అవకాశం వుంది.

### 8. కోరిక కలగకపోవడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి ?

కొంతమంది స్త్రీలు తమ మనసు ఎటువంటి సెక్స్ స్పందనలు లేకుండా వుందని అంటారు. వారికి ఎటువంటి స్పందనలు కలగవు.

మరికొందరు స్త్రీలు మామూలుగా ఎటువంటి సెక్స్ కోరికలు లేకుండా వుంటారు. తమలో ఎటువంటి సెక్స్ ఆలోచనలు రావని అంటారు. కానీ వారికి తగిన పురుషుడు తారసిల్లి సెక్స్ పరంగా ప్రేరణ కలిగిస్తే సెక్స్ కోరికలు ఉరకలేసి, సెక్స్ లో తృప్తి పొందడమూ వుంటుంది.

ఇంకొందరు స్త్రీల పరిస్థితి వింతగా వుంటుంది. వారిలో సెక్స్ కోరికలు వుండవు. సెక్స్ పరంగా ప్రేరేపించినా ఎటువంటి స్పందనలు కలగు. కానీ అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు వారి యోనిలో సుఖప్రాప్తి కలిగినప్పుడు కలిగే కండర సంకోచం కలుగుతుంది. అయితే ఆ కండర సంకోచం మధురానుభూతి కలిగించే బదులు ఒక విధమైన బాధని కలిగిస్తుంది.

సాధారణంగా స్త్రీలోనైన, పురుషునిలోనైనా సెక్స్ కోరిక కలగడం, ఆపోజిట్ పార్ట్ నర్ ప్రేరణతో మరింత ఎక్జైట్ అవడం, ఆపైన సుఖప్రాప్తి పొందడం జరుగుతుంది. ఈమూడు దశల్లో ఏదశలోనైనా అవరోధం ఏర్పడితే సెక్స్ యాక్ట్ కంప్లీట్ అవదు.

సెక్స్ కోరిక కలగకపోవడానికి గానీ రతిక్రియలో మధ్యలోనే అవరోధం ఏర్పడడానికి గానీ మనసు ముఖ్య కారణం. మనసులో యాంక్షెటీ వున్నా, మెంటల్ కాన్ ఫ్లిక్ట్ వున్నా, డిప్రెషన్ వున్నా సెక్స్ వల్ పెర్ ఫార్మెన్స్ సక్రమంగా వుండదు. అందుకని ఎవరిలోనైనా రతిలో ఆనందించడం వుండకపోతే వారి మానసిక స్థితిని ఒకసారి పరిశీలించవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది.

## చేదు అనుభవాలు కలిగించే ఫ్రీజిడిటి

కొందరికి యవ్వనంలో అడుగు పెడుతుండగానే సెక్స్ విషయంలోకొన్ని చేదు అనుభవాలు, భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. సెక్స్ అంటేనే భయం ఏర్పడి, సెక్స్ అంటేనే ఏవగింపు కలుగుతుంది. దానితో వారిలో ఎటువంటికోరికలు లేకుండాపోతాయి. ఒకవేళపెళ్ళయినా ఏ స్పందనలు వుండవు.

కొందరు అమ్మాయిలు తమ చిన్న వయస్సులోనే తమ అక్కయ్యలకిగాని, తెలుసుకున్నవాళ్ళకిగాని భర్తలు పెట్టేవేధింపులు, కుటుంబంలో వచ్చే గొడవలు, ప్రసవించలేక మరణించడాలు చూసి అతిగా కలతచెందుతారు. వారి దృష్టిలో అన్ని బాధలకి సెక్స్ మూలం అనుకుంటారు. సెక్స్ కోరిక లేని అమ్మాయిల సైకో ఎనాలసిస్ చేస్తే ఎందరిలోనో ఇటువంటి మానసిక పరిస్థితి బయటపడుతుంది.

## భర్తలో తండ్రని చూసే పరిస్థితి

కొంతమంది స్త్రీలకి భర్తని చూస్తే ఎటువంటి స్పందన కలగదు. తండ్రని చూసినట్లు అన్నయ్యని చూసినట్లో అనిపిస్తుంది. దానికి తోడు వారు పెరిగిర వాతావరణం వారిలో సెక్స్ అంటే తప్ప అనేభావం పెంపొందిస్తుంది. ఇటువంటి మానసికస్థితి వల్ల వారిలో సెక్స్ కోరిక, సెక్సువల్ ఎక్జైట్ మెంట్ లేకుండా అవుతుంది.

కొందరిలో హోమోసెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ వుంటాయి. స్త్రీలకి స్త్రీలమీద, పురుషులకి పురుషుల మీద మనసు కలుగుతుంది. అటువంటి కోరికలు కలగడం తప్పని, తమ వనస్తత్వంలో, ఆలోచనల్లో లోపం వుందని తెలుసు.

అందుకని మనసుని సహజంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ కుదరదు. తప్ప ఆలోచనలని మార్చుకోలేకపోతారు. సహజమైన వాంఛలని కలిగించుకోలేక చివరికి మానసిక సంఘర్షణకి గురి అవుతారు. అలా దారి తీసిన మానసిక సంఘర్షణ చివరికి ఏ కోరికాలేకుండా, ఎటువంటి ఎక్జైట్ మెంట్ లేకుండా సెక్స్ లో పాల్గొన్నా తృప్తి కలుగకుండా చేస్తుంది.

సెక్స్ కోరిక లేదన్నా సెక్స్ లో తృప్తిదలగడంలేదన్నా ఇటువంటి మానసిక సంఘర్షణని దృష్టిలోవుంచుకుని సైకో డెరఫీ ద్వారా సరిచేయడానికి కృషిచేయాలి.

## ౨. సెక్స్ మీద మానసిక ఒత్తిడి ప్రభావం

మానవజీవితంలో వేగం ప్రవేశించిన దగ్గర్నుంచి రకరకాల మానసిక ఒత్తిడులు మనిషిని కుంగదీయడం మొదలైంది. ఇంటా- బయటా ఎన్నో సమస్యలు వుంటున్నాయి.

ఈరకంగా తలెత్తే మానసిక ఒత్తిడి సెక్స్ మీద కొంత ప్రభావాన్ని చూసిస్తుంది. సెక్స్ లో అసక్తి తగ్గిపోవడం, సమర్థవంతంగా పాల్గొనలేకపోవడం, సెక్స్ లో పాల్గొన్నా పూర్తి తృప్తి పొందలేకపోవడం జరుగుతుంది.

సెక్స్ లో సుఖప్రాప్తి ఎల్లలకు చేరుకోవలసిందిపోయి యాంత్రికంగా సెక్స్ ని ఏదో కొంతమాత్రమే అనుభవించటం జరుగుతుంది.

## మానసిక ఒత్తిడిని పెంచే ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు

ఉద్యోగాల్లో, వ్యాపారాల్లో, ఇంటి కార్యక్రమాల్లో నిత్యం సతమతమయ్యే వాళ్ళు కొత్తగా పెళ్ళయి అనుభవించవలసిన సెక్స్ సుఖాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారు. దానికి కారణం అనుక్షణం వారిమనసుల్లో ఉద్యోగం గురించో, వ్యాపారం గురించో, మరొక దాని గురించో ఆలోచన, ఆందోళన ఎక్కువ చోటు చేసుకోవడమే. మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకావడమే.

మానసిక ఒత్తిడికిలోనైన వ్యక్తులు ప్రతిచిన్న విషయానికీ ఊరికనే కంగారుపడుతుంటారు. కొందరిలో ఈ ఒత్తిడివలన భయం, ఆందోళన కలుగుతాయి. గుండెవేగంగా కొట్టుకుంటుంది. రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపట్టడం వుండదు. విపరీతమైన ఆలోచనలు వస్తుంటాయి.

## మానసిక ఒత్తిడిలో కనబడే వింత ప్రవర్తన

మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనవాళ్ళు ఇతరులతో ష్రీగా మాట్లాడలేరు. అంతకుముందువరకు అందరితో ఎంతో చనువుగా, హుషారుగా వుండేవ్వకీ ముఖావంగామారతాడు. పైగావారిలో ఒక విధమైన న్యూనతాభావం, పోస్టుపోస్ట్ మెంట్ మెంటాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. కొద్దిసేపు పనిచేస్తేనే చాలు బాగా అలసటకు గురవుతారు.

మానసిక ఒత్తిడనేది కేవలం పురుషులలోనే కాదు, స్త్రీలోనూ కనబడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడికి లోనైన గృహిణి చిన్న విషయానికే పిల్లల్ని కొట్టడం, విసుక్కోవడం, భర్తపై చిరుబురులాడటం, ఇంటివాళ్ళతో, పక్కంటివాళ్ళతో గొడవలు పడటం వుంటుంది. అంతేగాక వారిలో తరచూ అలసట, చిన్నదానికే కంగారు, ఎప్పడూ తలపాపి కనబడతాయి.

## విద్యార్థుల్లో కూడా మానసిక ఒత్తిడి

విద్యార్థుల పై కూడా మానసిక ఒత్తిడి ప్రభావం అధికంగా వుంటుంది. ఇంట్లో ఎదుర్కొనే సమస్యలు, విద్యా విషయాల్లో ఏర్పడే సమస్యలు వీరి పై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. దానివల్ల వారు సరిగ్గా చదవలేకపోవడం, చదువుమీద ఏకాగ్రత లోపించడం, పరీక్షసమయంలో కంగారు, భయం చోటుచేసుకోవడం, ఇతరులతో ష్రీగా మూవ్ కాలేకపోవడం మొదలైనవి ఏర్పడతాయి.

మానసిక ఒత్తిడి కలిగినవారిలో కడుపులో మంట, ఆకలిలేకపోవడం, అంతుపట్టని శారీరకబాధలు కలుగుతాయి. కోపం, చిరాకు, విసుగు, నిరాశ ఎక్కువ అనిపిస్తాయి.

## శారీరక అనారోగ్యంగా కనిపించే మానసిక ఒత్తిడి

ఈ విషయం తెలియక చాలామంది మానసిక ఒత్తిడివల్ల కలిగే బాధలని శారీరక అనారోగ్యంగా భావించి ఏవేవో మందులు వాడుతుంటారు. వారు మానసిక ఒత్తిడి తొలగించుకుంటే ఆ బాధలు ఏ మందుల ప్రమేయం లేకుండా తొలగిపోతాయి.

మానసిక ఒత్తిడిని మొదటిలోనే గుర్తించి అభిగమించాలి. మానసిక ఒత్తిడి ఎందువల్ల కలుగుతుందో, దాని ప్రభావం మనిషి ప్రవర్తనమీద ఎలా వుంటుందో అర్థం చేసుకుంటే మొదట్లోనే దానిని సరిదిద్దుకోవచ్చు. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా, ఎన్ని పనులు చేయవలసివచ్చినా మనస్సును ప్రశాంతంగా వుంచుకోవచ్చు.

## మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం ఎలా ?

మానసిక ఒత్తిడికి ఎక్కువగా గురైనవ్వకై రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, సైకోడైరఫీ, హిప్నోథెరఫీ ద్వారా దానిని అభిగమించవచ్చు. బ్రాంక్సిలైజర్స్ కూడా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, మనషికి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి తోడ్పడతాయి.

## 10. కొందరు స్త్రీలకి సంయోగంలో పాప్తి ఎందుకని ?

ఎక్కువమంది స్త్రీలలో సాధారణంగా సంయోగసమయంలో బాధకలిగించే వ్యాధులు - ట్రైకోమోనియాసిస్, మొనిలియాసిస్, వీటివల్ల యోనిమార్గం పూసినట్లయి సంయోగంలో బాధపుట్టిస్తాయి.

గనేరియా వున్నప్పుడ కూడా యోనిమార్గం వుండుగా మారి సంయోగంలో మంట, నొప్పి, కలిగిస్తాయి.

కొందరికి పురుషాంగం ప్రవేశిస్తువుంటేనే బాధవుంటుంది. వీరికియోనిదగ్గర చీరుకుపోయినా, చీముగడ్డలు తయారైనా, పుండ్లుపడినా సంయోగం బాధాకరంగా వుంటుంది.

కొందరికి కాన్సులో కుట్లుపడతాయి. ఆ కుట్లు పూర్తిగా మానవు. చీముపట్టి పచ్చిగానే వుండిపోతాయి. ఇటువంటివారికి సంయోగంలో నొప్పి అనిపిస్తే తగిన యాంటిబయాటిక్స్ వాడి చికిత్సపొందితే గాయం మాని మామూలు అవుతుంది.

## యోని ప్రక్కనే బాధ కలిగించే చీము గడ్డలు

యోనిద్వారం పక్కనే బార్థోలిన్ గ్రంధులు వుంటాయి. కొందరికి ఈ బార్థోలిన్ గ్రంధులు ఉబ్బుతాయి. ముఖ్యంగా గనేరియా వ్యాధివున్న స్త్రీలలో బార్థోలిన్ గ్రంధి వాచడం సహజం. ఈ గ్లాండు వాపువల్ల సంయోగంలో పొల్లినాలంటే బాధ అనిపిస్తుంది. ఆపరేషన్ చేసి చీముని తీసివేయడం, గనేరియాకి మందు వాడడం చేస్తే నొప్పిపోతుంది.

కొందరికి యోని పెదవుల మీద చీముపాక్కులు వాస్తాయి. వాటివల్ల కూడా సంయోగంలో పాప్తి కలుగుతుంది.

షాంకరాయిడ్, హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ పుళ్ళురావడం వల్ల సంయోగంలో బాధవుంటుంది. అందుకని పరీక్షచేయించుకుని వ్యాధినిబట్టి చికిత్స పొందాలి.

కొందరు స్త్రీలు మర్కావయవాలదగ్గర రోమాలని తరచూ తొలగించుకోవాలని తెలియక అలాగే వుంచేసుకుంటారు. లేదా అశ్రద్ధతో చాలాకాలం అలాగే వుంచేసుకుంటారు. ఇలాబాగా పెరిగినా రోమాలు సెక్స్ లో పొల్లిన్నప్పుడు అంగప్రవేశంతో యోని మార్గంలోకి దూరుతాయి. పురుషుల కదలికతో వెంట్రుకలు రుద్దుకుపోయి యోనిమార్గం పుండుగా మారుతుంది. దానితో సంయోగం బాధాకరంగా మారుతుంది.

అందుకని ప్రతి స్త్రీ 10-15 రోజులకి ఒకసారి వెంట్రుకలని తొలగించుకోవాలి. మర్కావయవాల దగ్గర వెంట్రుకలు పెరగడంవల్ల సంయోగం బాధాకరంగా మారడమేకాకుండా అక్కడ చెమట ఎక్కువపట్టి చీముపొక్కులు, తామర, గజ్జివంటి వ్యాధులు రావడం జరుగుతుంది. అందుకని సెక్స్ హైజిన్ చాలా ముఖ్యం.

గర్భనిరోధానికి కొందరు కొన్నిరకాల బిళ్ళలు యోనిలో ప్రవేశపెట్టుకుంటారు. ఈ బిళ్ళలు రసాయనిక గుణం కలిగి వుండడం వల్ల యోనిమార్గం పుండుగా మారి సంయోగంలో బాధ కలుగుతుంది. తర్బనిరోధానికి వెజైనల్ టాబ్లెట్లు వాడేవారు, వాటిని వాడిన తరువాత సెక్స్ లో నొప్పి అనిపిస్తే వాటివల్లేనని గమనించాలి.

### అతిగా డూప్ కూడా హానికరమే

కొందరు స్త్రీలు యోనిమార్గం శుభ్రతకోసం డెట్టాల్, పాటాషియం పెర్మాంగనేట్ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటారు. కొందరికి ఈ కెమికల్స్ పడక యోని పుండుగా మారి సంయోగంలో నొప్పి కలుగుతుంది.

ఇటువంటి స్త్రీలు తాము శుభ్రత పాటిస్తున్నాంకదా, ఈ నొప్పి ఎందుకని ఆలోచనలో పడిపోతారు. శుభ్రతకోసం పాటించే ఆ పద్ధతే నొప్పికి కారణమని తెలుసుకోరు.

స్త్రీలలో కొందరికి గర్భాశయం కంఠానికి పూత, పుండువంటివి వస్తాయి. వీటివల్ల ఇతర బాక్టీరియా క్రిములు చేరి గర్భాశయం, దానిపక్కన వుండే ఇతర లిగమెంట్లు వాచి సంయోగంలో నొప్పికి కారణమవుతాయి.

గర్భాశయం పక్కనే ఓవలీస్, అండవాహికలు వుంటాయి. రకరకాల వ్యాధులవల్ల ఇవి వాచడం, చీముపట్టడం, జరుగుతుంది. ఇవేకాకుండా గర్భసంచిని పట్టివుంచే ఇతర లిగమెంట్లువాచి, వాటిదగ్గరే చీముగడ్డలు తయారవుతాయి. ఇలా పొత్తికడుపులో గడ్డలు, వాపు తయారైనప్పుడు సంయోగంలో నొప్పి అనిపిస్తుంది.

### ఆసుపత్రులలో కాన్పులు అనేక బాధలకు దూరం

శుభ్రమైన పద్ధతిలో కాన్పులు చేయినప్పుడు, అక్రమపద్ధతిలో గర్భస్రావం చేయించుకున్నప్పుడు, మామూలుగానే గర్భస్రావమైనా పూర్తిగా అవనప్పుడు, సుఖవ్యాధులు వచ్చినప్పుడు, గర్భాశయం ట్యూబులు, ఓవలీస్ వాయడం, చీముగడ్డలు తయారవడం జరుగుతుంది. వీరిలో కొందరికి సంయోగంలో స్ట్రాక్ట్ గట్టిగా లేనప్పుడు బాధ అనిపించదు. సంయోగం తరువాత నొప్పిబయటపడి గంటలకొద్దీ బాధపడుతుంది.

ఇటువంటి పరిస్థితి వున్నవారికీ గర్భాశయం, ట్యూబులు, ఓవలీస్, లిగమెంట్లువాపు వుండడమో, చీము గడ్డలు వుండడమో కారణం. పి.వి. చేసినా, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసిపా, వాపు, చీముగడ్డలు విషయం తెలుస్తుంది. కొందరికి ఈ పరిస్థితి మందులతో చక్కబడితే మరికొందరికి ఆపరేషను అవసరమవుతుంది.

## 1.1. స్త్రీలకి మూత్రవిసర్జనలో మంట ఎందుకని ?

స్త్రీలలో మూత్రవాహికల్లో వ్యాధి కలగడానికి వారి జననేంద్రియాల నిర్మాణమే కారణం. ఎక్కువమంది స్త్రీలలో వ్యాధిక్రిములు కిందినుంచి పైకి చేరుతాయి. దీనికి మూత్రనాళం (యరెద్రా) యోనిద్వారం పైనే వుండటం, మూత్రనాళం చిన్నదిగా వుండటమే కారణం. అందుకని యోనిదగ్గర చేరిన క్రిములు అతి తేలికగా, అతి త్వరగా మూత్రాళం నుంచి మూత్రవాహికలకి, ఆపైకి ప్రయాణించగలుగుతాయి.

### స్త్రీలల్లో మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులే ఎక్కువ ?

పెళ్ళి అయిన స్త్రీలలో మూత్రవాహికలకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ కలగడం ఎక్కువ. ఇటువంటి స్త్రీలకి సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు తరచు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి మూత్రం మంట అనిపించడం, తరచు మూత్రం రావడం వుంటుంది. సెక్స్ లో పాల్గొనడం మానేస్తే ఏ బాధా లేనట్లు అనిపిస్తుంది.

యోని దగ్గర, యోని మార్గం లోపల ఎప్పుడూ కొద్దో వ్యాధిక్రిములు వుంటాయి. అవి మామూలుగా ఎటువంటి వ్యాధిని కలిగించకుండా వుంటాయి. అవి మూత్రనాళంలోకి, మూత్రవాహికల్లోకి చేరినప్పుడే వ్యాధి లక్షణాలని కలుగజేస్తాయి.

కొందరు స్త్రీలల్లో మూత్రనాళం సన్నగా వుండి, కాస్త ముడతపడివుంటుంది. వారికి మూత్రవాహికలలో క్రిములు చేరి స్థావరం ఏర్పర్చుకుంటాయి.

మంచి నీళ్ళు తక్కువ తాగేవారిలో మూత్రవాహికకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఎక్కువ. చమట ద్వారా నీరు ఎక్కువ కోల్పోయే వారిలోనూ, శాలీరక శ్రమ ఎక్కువ చేసేవారిలోనూ, ఎండలో ఎక్కువసేపు వుండేవారిలోనూ మూత్రవాహికలకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఎక్కువ.

### రోజుకి మూడు లీటర్ల మంచి నీళ్ళతో యూరినరి ఇన్ఫెక్షన్ దూరం

మూత్రం ఎక్కువ అవడానికి నీరు ఎక్కువ తీసుకోవాలి. రోజుకి కనీసం మూడు లీటర్ల నీరు తాగాలి. ప్రతి ఒక్కరు రోజుకి నుంచి 5 లీటర్ల నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రవహించే నీరులో మురికి నిలవ లేనట్లే మూత్రం ఎక్కువ అయ్యేవారిలో మూత్రవాహికల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కలగడం అరుదు.

షుగర్ వ్యాధి వున్నవారిలో మూత్రం ఎక్కువ అవడం వుంటుంది. అయినప్పటికీ వారిలో మూత్రవాహికల ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఎక్కువ. బెల్లం వున్నచోట చీమలు చేరేవిధంగా మూత్రంలో షుగర్ వుండబట్టి వ్యాధిక్రిములు చేరుతాయి.

## నూతన వధూవరుల్లో హనీమూ సిస్టయిటిస్

కొందరు అమ్మాయిలు ఫస్ట్ నైట్ జరిగిన 1-2 రోజుల్లోనే మాత్రం మంట అనీ, జ్వరంగా వుందనీ, పొత్తికడుపు నొప్పిగా వుందనీ విలవిలలాడతారు. ఇటువంటి పరిస్థితినే హనీమూన్ సిస్టయిటిస్ అంటారు.

ఫస్ట్ నైట్ లో సెక్స్ లో పాల్గొనడంతో కొందరు అమ్మాయిలలో యోనిద్వారం కొంత ఒరుసుకుపోవడమే కాకుండా మూత్రద్వారం కూడా ఒరుసుకుపోతుంది. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా శరీరంలో కాస్త గాయమైతే బాక్టీరియా క్రిములు తేలికగా చురుతాయి. అదే విధంగా యోని దగ్గర బాక్టీరియా క్రిములు చేరి మూత్రద్వారం ద్వారా క్రిములు పైకి చేరి తాత్కాలికంగా వ్యాధి లక్షణాలు కలుగజేస్తాయి.

కొందరిలో హనీమూన్ సిస్టయిటిస్ తేలికగా తగ్గిపోతే మరికొందరిలో యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడవలసివస్తుంది. ఇటువంటివారు నార్ ఫ్లాక్స్ -400 గానీ, ఉదయం-1, రాత్రి-1 చొప్పున వారం-పది రోజులు వాడితే ఇన్ ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది. మూత్రం మంట ఎక్కువ వుంటే పై యాంటీబయాటిక్ మందులతో పాటు యారిస్సాస్ బిళ్ళలు ప్రతీ 6 గంటలకి ఒకటి మంట తగ్గేవరకు వాడాలి.

## సుఖవ్యాధులు కలిగించే మూత్రవాహికల వ్యాధులు

అంతేకాకుండా కొందరిలో గనేరియా వంటి లైంగిక వ్యాధులు ఊత్రవాహికల ఇన్ ఫెక్షన్ కారణం.

ట్రైకోమోనియాసిస్, కాన్ డిడాసిస్ వల్ల కూడా మూత్రంలో మంట, తరచు మూత్రం రావడం వుంటుంది. దానిని గుర్తించి తగిన చికిత్స చేయాలి. కొందరిలో టి.బి వంటి వ్యాధులు వుండి మూత్రంలో మంట వుండవచ్చు. అలాగే మూత్రకోశంలో, మూత్రవాహికల్లో కంతులు, రాళ్ళు వుండి మూత్రవాహికల్లో తరచూ ఇన్ ఫెక్షన్ రావచ్చు.

మూత్రవాహికల్లో తరచు ఇన్ ఫెక్షన్ వస్తుంటే ఆల్బాసాండ్ స్కానింగ్, ఐ.వి.పి. ఎక్స్ రే, కల్చర్ టెస్టులు, ఇతర పరీక్షలు చేయాలి.

## 12. పెద్దాపరేషన్ అయిన ఎంతకాలానికీ సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు ?

కొందరు స్త్రీలకి వయస్సులో వుండగా హిస్టెరెక్టమీ ఆపరేషన్ అయి గర్భసంచి తీసివేయడం జరుగుతుంది. గర్భసంచి తీసివేయడంలో కొందరిలో సెక్స్ పెరిగిపోతుంది. దానికి కారణం గర్భం వస్తుందనే భయం తొలగిపోవడం లేదా అంతవరకు బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సతమతమైన వారికి రిలీఫ్ రావడం.

## పెద్దాపరేషన్ అయినవారిలో సెక్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ రెండు నెలలే.

హిస్టెరెక్టమీ ఆపరేషన్ అయిన తరువాత సెక్స్ లో ఎంతకాలానికీ పాల్గొనాలో తెలియక కొందరు దంపతులు ఆరునెలలు, సంవత్సరం ఆగిపోతారు. ఒకప్రక్క సెక్స్ కావాలనే వేడి కోరిక, మరొకప్రక్క సెక్స్ లో పాల్గొంటే ఏమోతుందోన్న భయం. ఈ గందరగోళంలో అర్థంలేని చిరాకు, కోపం చోటుచేసుకుంటాయి.

ఫరేషనర్ చేసి గర్భసంచి తీసివేసినా రెండునెలలనుంచి సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు. అంతా బాగుంటే నెలా పదిహేనురోజులకే సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు. ఎంత ఆగినా 3 నెలలకి మించి ఆగనవసరంలేదు.

ఇంతా ఆగి చివరికి ఎంతో కోరికతో సెక్స్ లో పాల్గొంటే కొందరు దంపతులకి అనుకోని విచిత్రసమస్యలు ఎదురవుతుంది. ఆపరేషన్ కి ముందు ఎంతో చక్కగా అంగప్రవేశం జరగడం వుండగా, ఆపరేషన్ అయిన తరువాత అంగం పూర్తిగా ప్రవేశించకుండా అవుతుంది. పైగా స్త్రీనొప్పి అంటూ బిగబీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. దీనికి కారణం ఆపరేషన్ వల్ల యోనిమార్గం కాస్త టైట్ అవడం, చిన్నది అవడం.

హిస్టెరెక్టమీ అయిన స్త్రీలలో తొలిబిటాలో యోనిమార్గంలో తడి తగ్గుతుంది. యోనిలోపల ఎండినట్లు అవుతుంది. దానితో అంగప్రవేశం సునాయసంగా జరగక పట్టినట్లు అవుతుంది. జైలోకైన్ జెల్ గాని, కెవై. జెల్ గాని, నూనెగాని, వేజలైన్ గాని సెక్స్ లో పాల్గొనేముందు యోనిమార్గంలో రాస్తే అంగప్రవేశం తేలికగా జరుగుతుంది. కొద్దిరోజులు ఆవిధంగా చేస్తే ఆపైన యోనిమార్గం లూజ్ అయి అంగప్రవేశం సులువు అవుతుంది.

### పెద్దాపరేషన్ తో యోనిలో కలిగే తేడాలు

గర్భాశయం తీసివేయడం వల్ల యోనిమార్గం పాడవు తగ్గినట్లు కనబడినా రెగ్యులర్ గా సెక్స్ లో పాల్గొనడంతో 2-3 వారాల్లో యోని సాగి పూర్వం లాగానే అంగం పూర్తిగా లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది.

కొందరు స్త్రీలకి గర్భంసంచితోపాటు అండాశయాలు ( ఓవరీస్ ) రెండింటినీ తొలగిస్తారు. అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తక్కువై యోని ఎండినట్లు అవుతుంది. దానివల్ల అంగప్రవేశంతో నొప్పి, మంట కలుగుతాయి. ఇటువంటి స్త్రీలు ఇవలాన్ క్రీమ్ యోనిలోపల రాస్తే టిష్యూలు ఆరోగ్యకరంగా మారడమే కాకుండా అంగప్రవేశం కూడా తేలికగా జరుగుతుంది.

హిస్టెరెక్టమీతోపాటు ఓవరీస్ రెండింటినీ తీసివేయబడిన కొందరు స్త్రీలలో 40-50 సంవత్సరాలలో రావలసిన మెనోపాజ్ లక్షణాలు ముందుగానే వస్తాయి. నిద్రపట్టకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం, డిప్రెషన్ లక్షణాలు కలగడం ఒళ్ళు వేడిగా అనిపించడం, చమటలు ఎక్కువ పోయడం, శారీరక, మానసిక బాధలు కలగడం వుంటాయి. ఇటువంటివారికి ఇవలాన్ వంటి ఈస్ట్రోజన్ బిళ్ళలు ఆరు నెలలు వాడాలి. కొందరికి 2-3 సంవత్సరాలు వాడాలి.

### సర్విక్స్ కి కేన్సర్ వచ్చినా సెక్స్ కి అవరోధం లేదు

కొందరు స్త్రీలకి గర్భాశయకంఠానికి కేన్సర్ రాగా కరెంట్ పెడతారు. కరెంట్ పెట్టడం వల్ల యోనిమార్గం కొంత కుదించుకుపోతుంది. గర్భాశయానికి కేన్సర్ రావడంతో ఇక సెక్స్ లో పాల్గొనకూడదనీ, సెక్స్ కి దూరంగా వుండాలని అనుకుంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు.

కేన్సర్ కి చికిత్స పూర్తికాగానే దంపతులిద్దరూ తప్పకుండా సెక్స్ లో పాల్గొనాలి. లేనిపక్షంలో యోనిద్వారం మరింత బిగబీసుకుపోతుంది. రెగ్యులర్ గా సెక్స్ లో పాల్గొంటేనే యోని మార్గం వదులుగా వుంటుంది. కేన్సర్ వచ్చిందని సెక్స్ లో పాల్గొనకుండా మానేయనవసరంలేదు.

### 13. ఓల్డేజ్ వస్తే సెక్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టవలసిందేనా ?

ఎంత వయస్సు వచ్చినా స్త్రీకిగాని, పురుషునికిగాని సెక్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ అనేది లేదు. సెక్స్ పరంగా ఉప్పొంగే మనసు, శారీరక ఆరోగ్యం వుంటే 70 సంవత్సరాలు దాటినా, 80 సంవత్సరాలు దాటినా సెక్స్ లో పాల్గొనే సామర్థ్యం, ఎంజాయ్ చేసే మనసు వుంటాయని వైద్య పరిశీలనల్లో తేలింది..

సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తిలో కోరిక కలగడం, సంయోగం కొనసాగించడం, సుఖప్రాప్తి పొందడం, తిరిగి మామూలు స్థితికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. 60 సంవత్సరాలు నిండినా, 70 సంవత్సరాలు నిండినా, ఈ నాలుగు దశలు ఉంటాయి.

అయితే 40-50 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి స్త్రీలో యోనోపాజ్ రావడం వల్ల కొన్ని మానసిక శారీరక మార్పులు కనబడతాయి. పైగా పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు, సంసార బాధలు జీవితాన్ని యాంత్రికంగా మారుస్తాయి. పురుషునిలోనూ బరువు, బాధ్యతలు సెక్స్ యెడల ఉత్సాహాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఆ పరిస్థితినుంచి బయటపడి ఉపారుగా మారితే సెక్స్ లో ఆసక్తి, తృప్తి వుంటాయి.

#### **ఆరోగ్యానికి సెక్స్ లో పాల్గొనడం ముఖ్యం**

40-50 సంవత్సరాలు దాటిన తరువాత యోనోపాజ్ వచ్చి స్త్రీలో సెక్స్ హార్మోన్లు తగ్గడం, 50-60 సంవత్సరాల మధ్య పురుషునిలో టెస్టోస్టిరోన్ తగ్గడం, వాన్నా సెక్స్ లో యాక్టివ్ గా వుంటే సెక్స్ లైఫ్ లో తేడా లేదు. సెక్స్ హార్మోన్లు శాతం తగ్గుదల యాక్టివ్ సెక్స్ లైఫ్ ని ప్రభావితం చేయడం చాలా అరుదు. రెగ్యులర్ గా సెక్స్ లో పాల్గొనవివారిలో, యాంత్రికంగా సెక్స్ లో పాల్గొనేవారిలో ఈ తేడా కొంత కనబడుతుంది. దానితో వారిలో ఆందోళన, డిప్రెషన్ కలుగుతాయి. ఇవి మరింత డీప్ చేస్తాయి.

వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ రక్తపోటు, గుండెపోటు, నరాలజబ్బులు కొందరిలో కలుగుతాయి. ఇటువంటప్పుడు సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చో, పాల్గొనకూడదో తెలియనివాళ్ళు చాలామంది వుంటారు. మొదట్లో కోరికవున్నా, సెక్స్ లో పాల్గొంటే ఏమవుతుందోనని మనసు మళ్ళించుకుంటారు. కానీ రక్తపోటు వున్నా, గుండెపోటు వచ్చినా, పక్షవాతం వచ్చినా చికిత్స పొందుతూ డాక్టర్ చెప్పినవిధంగా సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు. అంతేగాని మానేయకూడదు.

#### **వయస్సు మళ్ళినవారిలో దిగులు సెక్స్ ని దెబ్బ తీస్తుంది**

సెక్స్ కోరికని అణచివేసుకుంటే టెన్షన్ పెరిగి మరింత అనారోగ్యం కలిగే అవకాశం వుంది. సెక్స్ లో పాల్గొంటే మనసులో కలిగే టెన్షన్ కి లిలీఫ్ వచ్చి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

50-60 సంవత్సరాలు వచ్చిన పురుషులలో ప్రాస్టేటు గ్రంథి పెరగడంతో సర్జరీ చేయవలసివస్తుంది. ప్రాస్టేట్ గ్రంథిని తొలగించడంతో ఇకనుండి సెక్స్ లో పాల్గొనలేమని కొందరు, అపోహపడతారు. ఆపరేషన్ ముందువరకు సెక్స్ లైఫ్ లో యాక్టివ్ వున్నవారు ఆ తరువాత కూడా సెక్స్ లో యాక్టివ్ గానే వుంటారు.

వయస్సు మళ్ళినవారు సెక్స్ లో సమర్థత మరింత పెంపొందడానికి లైంగిక ఉత్తేజం దులు కావాలని కోరుతారు. లైంగిక ఉత్తేజకమందులుగా ఇచ్చేవన్నీ జనరల్ హెల్త్ ని పెంపొందించేవే. ఆరోగ్యం బాగుండటంతో సెక్స్ లో కూడా హుషారు పెంపొందుతుంది. శక్తి అనిపిస్తుంది.

సెక్స్ లో సమర్థవంతంగా పాల్గొనాలంటే మంచి ఆరోగ్యం, చక్కని వ్యాయామం, కంటినిండా నిద్ర అవసరం. ఎంత వయసు మీదపడినా చక్కని సెక్స్ కి ఉత్తేజకాలు ఇవే. వీటికి తోడు జీవితభాగస్వామి ఆరోగ్యంగా కనబడుతూ, ఉల్లాసంగా వుంటూ, సరదాగా కబుర్లుచెబుతూ, స్నేహంగా దగ్గరవుతూ, సెక్స్ గా చూపులు విసురుతూ వుంటే అన్నింటికీ మించిన లైంగిక ఉత్తేజకం అదే.

చాలామంది పురుషులు వయస్సు మళ్ళిన తరువాత సెక్స్ లో పాల్గొంటేనూ, వీర్యం కోల్పోతేనూ, వృధాప్యం మరింత పెరిగిపోతుందని, ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందని అపోహపడుతుంటారు. దానితో తెలియకుండావారిలో సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ తగ్గిపోతాయి. వీర్యం ఎంత పోయినా, సెక్స్ లో ఎంత పాల్గొన్నా నష్టం లేదు.

సెక్స్ లో పాల్గొనడం తగ్గిస్తే సెక్స్ మరింత తగ్గుతుంది. ఎంతో క్రైస్ గ్లాండ్స్ డల్ గా మారుతాయి. సెక్స్ లో యాక్టివ్ గా వుండేవారిలో సెక్స్ గ్లాండ్స్ చక్కగా సెక్స్ హార్మోన్స్ ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అందుకని వయసు ముదిరినా ఎటువంటి జంకులేకుండా, సెక్స్ లైఫ్ ని కొనసాగిస్తూ వుంటే మనిషి యంగ్ గా వుంటాడు. మనసు ఉషారుగా వుంటుంది. ముసలితనం వచ్చేచసందని మనిషి కృంగిపోవడం, వైరాగ్యం రావడం వుండదు. ఎంత వృధాప్యం వచ్చినా స్త్రీకైనా పురుషునికైనా సెక్స్ లైఫ్ కి ఎండ్ పాయింట్ లేదు.

కొందరిలో సెక్స్ విషయంలో యంగ్ గా ఉన్నామనే భావం మిగిలి ఉంటుంది. సెక్స్ లో యంగ్ గా ఉన్నామనే భావం కలిగినప్పుడే సెక్స్ లో పూర్తి తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు.

### 14. గర్భం రావడానికి వీర్యకణాల సంఖ్య ఎక్కువ ఎందుకు ఉండాలి ?

గర్భం రావడానికి ప్రతిసారి స్థలించే వీర్యం 2-3 యం.యల్. వుండాలి. ప్రతి యం.యల్ లోనూ కనీసం 40 మిలియన్లు వీర్యకణాలుండాలి. గర్భధారణకు కావలసింది ఒకటే వీర్యకణమైనా వీర్యంలో లక్షలు, కోట్లు వీర్యకణాలు అవసరమవుతాయి.

యోని మార్గంలో వుండే ద్రవాలు ఆమ్లగుణం కలిగివుంటాయి. వీర్యకణాలు క్షారగుణంగల వాతావరణంలోనే చక్కగా వుంటాయి. ఆమ్లగుణం గల ద్రవాలలో అనేక వార్యకణాలు చైతన్యాన్ని కోల్పోతాయి.

### **యోనిమార్గంలో వీర్యకణాల ప్రయాణం**

అదీగాక యోనిమార్గంలోనూ, గర్భకోశం లోనూ గోడలకు ఎపిథీలియల్ టిష్యూ వుంటుంది. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ కదలిక వీర్యకణాల కదలికకి వ్యతిరేక దిశలోవుంటుంది. వీర్యకణాలు గర్భకోశంలోకి అండవాహికల వైపుకి ప్రయాణిస్తూ వుంటే యోని మార్గం లోనూ, గర్భకోశంలోనూ వుండే ఎపిథీలియల్ టిష్యూ సీలియరీ మూవ్ మెంట్ ద్వారా వాటి వ్యతిరేక దిశలో కింది వైపుకి నెట్టుతూ వీర్య కణాలకి అవరోధం కలిగిస్తాయి.

యోనిమార్గంలోనూ, గర్భాశయంలోనూ వుండే కణాలు సీలియరీ మూవ్ మెంట్ ద్వారా అలా చేయడానికి ఒక కారణం లేకపోలేదు. ఈ కణాలు సీలియరీ మూవ్ మెంట్ ద్వారా వాటిల్లో వుండే వేస్టుని బయటికి తోయడానికి కృషి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ కూడా వీర్య కణాల పురోగమనానికి అవరోధం అవుతుంది.

## ఫెలోపిన్ ట్యూబులలో వీర్యకణాలు పడే తిప్పలు

ఫెలోఫియన్ ట్యూబ్స్ కూడా వీర్యకణాల ప్రయాణానికి వ్యతిరేకదిశలో కదులుతూ ముడుచుకుంటూ వుంటాయి. ఈ పెరిస్టాల్టిక్ కదలికకి కూడా వీర్యకణాలు ఎదురీద వలసిందే.

మరొక విషయం ఓవరీపస్ గర్భాశయానికి ఇటూ అటూ వుంటాయి. ఒకనెల ఒకవైపు ఓవరీ నుంచి అండం విడుదలూతే మరొక నెల రెండవవైపు ఓవరీ నుంచి అండం విడుదల అవుతుంది. ఓవరీస్ నుంచి విడుదలయ్యే అండాన్ని సేకరించడానికి గర్భాశయానికి రెండువైపులా ఒక్కొక్క ఫెలోఫియన్ ట్యూబు వుంటుంది.

నెలకి ఒకేసారి ఒక్కవైపే అండం విడుదలవటం వున్నా వీర్యకణాలు ప్రతీసారి వెండువైపులా ట్యూబుల్లోకి ప్రయాణిస్తాయి. ఈ రకంగా సగం వీర్యకణాలు వృధా అయిపోతాయి.

దీనికి తోడు వీర్యకణాలు ప్రయాణించే అండవాహికల మార్గంలో టిష్యూ ఎంతో అవరోధంగా వుంటుంది. వీర్యకణాలు అండవాహికల గోడ అంచులని పట్టుకుని ముందుకు సాగాలి. కానీ ఈ గోడ అంచుల్లో వుండే టిష్యూ వీర్యకణాల ప్రయాణానికి అనుకూలంగా వుండదు.

ఈ లిష్యూలలో హైలరూనిక్ యాసిడ్ లనే పదార్థం వుంటుంది. ఈ యాసిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ బలంగా వుండటంతో దానిని చేదించుకుంటే ముందుకు సాగడం కష్టమైనపనే.

## అనేక వీర్యకణాల బలిదానంతో ఒక వీర్యకణానికి మార్గం సుగమం

అయితే హైలరూనిక్ యాసిడ్ని శక్తిహీనం చేసే ఎంజైమ్ హైలరూనైడేజ్ వీర్య కణాల్లో వుంటుంది. వీర్యకణాలు అంత ఎక్కువ సంఖ్యలో వుంటే ఈ ఎంజైమ్ అంత ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది. హైలరూనైడేజ్ ఎంజైమ్ హైలరూనిక్ యాసిడ్ని శక్తిహీనం చేస్తుంది. ఈ రకంగా ఈ ఎంజైమ్ గర్భకోశంలోనూ, అండవాహికల గోడల్లోనూవుండే టిష్యూల్లో మార్పు తీసుకువస్తుంది.

ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీర్యకణాల్లో వుండే హైలరూనైడేజ్ ఎంజైమ్ వీర్యకణాలని అండానికి చేర్చడానికి మార్గం సుగమం చేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ ఎంజైమ్ అండంపైన వుండే పారని పలుచన చేసి ఏదో ఒక వీర్యకణం అకస్మాత్తుగా అండం లోపలికి చొచ్చుకుపోవడానికి దోహదం చేస్తుంది.

వీర్యకణాల సంఖ్య తక్కువ వుంటే హైలరూనైడేజ్ ఎంజైమ్ తక్కువ వుంటుంది. దాంతో అండంతో వీర్యకణం సంయోగం చెందే అవకాశాలు సన్నగిల్లుతాయి. ఎక్కువ సంఖ్యలో వీర్యకణాలు అన్ని రకాల అవరోధాలను అతిక్రమించి అండం దాకా చేరుకోగలగాలి. అప్పుడే గర్భధారణకి అవకాశం కలుగుతుంది.

## 15. వీర్యకణాలని నిర్వీర్యం చేసే వింత పరిస్థితి

కొందరు దంపతుల్లో అన్నీ సక్రమంగానే వుంటాయి. అయినా గర్భం రాదు. కొందరు స్త్రీలలో యోనిమార్గం లోపల వీర్యకణాలని నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితి వుంటుంది.

### వీర్యకణాలని నిర్వీర్యం చేసే యోని ద్రవాలు

యోనిమార్గంలోని ద్రవాలు ఆమ్లు (యాసిడ్) గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. ఆమ్లుగుణం మరీ ఎక్కువ వున్నట్లయితే వీర్యకణాలు చైతన్యరహితం అయి పోతాయి. గర్భధారణ కొరకు పైకి పయనించలేకపోతాయి. రతి అనంతరం యోనిమార్గంలోని ద్రవాన్ని తీసి మైక్రోస్కోప్ లో పరీక్షచేసినప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి బయటపడుతుంది.

సాధారణంగా దాంపత్య సంబంధాలలోపాల్గొన్న తరువాత వీర్యకణాలు నిరాటంకంగా గర్భకోశంలోకి ప్రయాణిస్తాయి. అక్కడనుండి అండవాహికల్లోకి ప్రయాణించి అండంతో సంయోగం చెందుతాయి.

కొందరు స్త్రీలలో వీర్యకణాలు యోనిమార్గంలోనే చైతన్యం కోల్పోయి పైకి ప్రయాణించలేకపోతాయి. దానికి ఆ స్త్రీ యోనిలో ద్రవించే ద్రవాలు కొంత కారణం కాగా, గర్భాశయ కంఠం దగ్గర తెల్లగా సుద్దగా వుండే పదార్థం మరికొంత కారణం.

### పోస్ట్ కాయటల్ టెస్ట్ ఎందుకని ?

ఇదిలావుండగా కొందరు పురుషుల వీర్యకణాల్లో కొన్నే యాక్టివ్ గా వుంటాయి. తక్కిన చైతన్యరహితంగా వుంటాయి. ఇటువంటివారిలో గర్భం రావడం మరింత కష్టం.

అన్నీ బావుండి గర్భం రాని పరిస్థితుల్లో పోస్ట్ కాయటల్ టెస్ట్ ( రతి అనంతర పరీక్ష ) చేయడం అవసరం. ఈ పరీక్ష రతిలో పాల్గొన్న రెండు గంటల తర్వాత చేయాలి. కనీసం ఆరుగంటలు నుంచి పదిగంటలలోగా ఈ పరీక్ష చేయాలి. అందుకని రతి అనంతరం జరిపే ఈ టెస్ట్ కి దంపతులు కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే డాక్టరు దగ్గరికి వెళ్ళడం అవసరం.

రతి అనంతరం చేసే ఈ పరీక్షలో యోని మార్గం నుంచి వీర్యకణాలు కలిసి వున్న ద్రవాన్ని పిపెట్ తో తీసి గ్లాస్ స్లైడ్ మీదవేసి మైక్రోస్కోప్ లో పరీక్షచేయటం జరుగుతుంది.

హైపవర్ ఫీల్డ్ లో మైక్రోస్కోప్ లో చూసినప్పుడు ప్రతి ఫీల్డ్ లోనూ కనీసం 20 నుండి 50 వీర్యకణాలు చక్కగా కదులుతూ ముందుకు ఈదుకుని పోతున్నట్లు కనబడాలి. అలా కనబడకపోతే వీర్యకణాలు యోని మార్గంలో ద్రవాలకి నిర్వీర్యం అయిపోతున్నాయని భావించాలి. అలాగే యోనిమార్గంలో ఆమ్లుగుణం ఎక్కువగా వున్నా, ఏవైనా వ్యాధులున్నా గర్భాశయకంఠానికి వుండువున్నా వీర్యకణాలు నిర్వీర్యం అవుతాయి.

## గార్భాశయకంఠం దగ్గర వీర్యకణాలకు తోడ్పడే మ్యూకస్

సాధారణంగా గర్భాశయం కంఠం దగ్గర జిగురు జిగురుగా పదార్థం వుంటుంది. దీనినే మ్యూకస్ అంటారు. ఈ మ్యూకస్ పదార్థం అండం విడుదలసమయానికి వీర్యకణాలు చొచ్చుకుని పోవడానికి అనుకూలంగా మారిపోతుంది. అండం విడుదల దినాల్లో రతి అనంతరం మ్యూకస్ ని ప్లాటినం లూప్ ద్వారా గానీ, పిపెట్ ద్వారాగానీ, సిరంజి ద్వారా గానీ తీసి మైక్రోస్కోప్ లో పరీక్షచేస్తే వీర్యకణాల చైతన్యపరిస్థితి తెలుస్తుంది.

అలా పరీక్ష చేసినప్పుడు మైక్రోస్కోప్ హైపవర్ లో ప్రతిఫీల్డ్ లోనూ కనీసం ఇరవై వీర్యకణాలు బాగా కదులుతూ కనబడాలి. గర్భాశయ కంఠం దగ్గర మ్యూకస్ ముద్దగా వుండి గర్భాశయం లోకి వీర్యకణాలు ప్రవేశించడానికి అడ్డంగా వుంటే గర్భం వచ్చే అవకాశం అంతగా వుండదు.

రతి అనంతరం చేసే ఈ పరీక్షకు ముందు గానీ తర్వాతగానీ జననేంద్రియాలని సబ్బు నీళ్లతో గానీ డెట్టాల్ తో గానీ వాష్ చేయకూడదు. కుటుంబ నియంత్రణ బిళ్లలు, ఫోమ్ బిళ్లలు మొదలైనవి అసలు వాడకూడదు.

యోనిలో ఎక్కువున్నా, వ్యాధులున్నా వాటిని నివారించడానికి చికిత్స చేయాలి. అలా చేసినట్లయితే వీర్యకణాల కదలిక చక్కగా వుంటుంది. యోనిలో వీర్యకణాలు నిర్వీరం అవుతుంది. గర్భధారణ మామూలుగా జరుగుతుంది.

కొందరిలో కొన్ని కారణాలవల్ల అండం ప్రయాణించే ల్యూబులు మూసుకుని పోతాయి. దానివల్ల అండం ప్రయాణించడం కుదరక గర్భం రాదు. మరి ట్యూబులు మూసుకుని వున్నాయా, మామూలుగా వున్నాయా తెలుసుకోవడానికి హిస్ట్రోసాల్పింగో గ్రామ్ క్లరే తీస్తే తెలుస్తుంది.

## పిల్లలు పుట్టనివారిలో పరీక్షలు

పిల్లలు పుట్టనివారి విషయంలో సాధారణంగా భర్తకి వీర్యం పరీక్ష. భార్యకి డి అండ్ సి, హిస్ట్రోపథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్, హిస్ట్రోసాల్పింగో గ్రామ్, ఆల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా లోపం ఏదైనదీ తెలుస్తుంది.

కొందరికి పైపరీక్షల్లో సరైన లోపం కనబడదు. అటువంటప్పుడు హార్మోన్ టెస్టులు, ఇతర టెస్టులు చేయవలసి వుంటాయి. అండం విడుదలలేని స్త్రీలలో ఫెరయిల్ వంటి బిళ్లలు ఒక క్రమపద్ధతిలో వాడటం, అవసరం బట్టి హార్మోన్ టెస్టులు, ఇతర టెస్టులు చేయవలసి వుంటాయి. అండి విడుదలలేని స్త్రీలలో ఫెర్టయిల్ వంటి బిళ్లలు ఒక క్రమపద్ధతిలో వాడటం, అవసరం బట్టి హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు వాడటం జరుగుతుంది. దానివల్ల అండం విడుదలై గర్భం వస్తుంది.

పురుషుల విషయంలో కూడా వీర్య కణాలు తగినన్ని లేకపోయినా, జీవం లేకపోయినా ఫెర్టయిల్ వంటి బిళ్లలు, హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు వాడవలసి వుంటుంది. కొందరు పురుషులకి వేరికోసీల్ వల్ల వీర్యకణాల సంఖ్య దెబ్బతింటుంది. వారికి వేరికోసీల్ ఆపరేషన్ చేసి లోపాన్ని సరిదిద్దాలి.

## వీర్యకణాలకు కూడా వ్యతిరేక కణాలు తయారవుతాయి

కొందరు దంపతుల విషయంలో ఇద్దరిలోనూ స్పష్టంగా ఏ కారపూ కనబడదు. అయినా సంతానం కలగదు. అటువంటి స్త్రీలలో వీర్యకణాలకి యాంటిబాడీస్ టుస్టుద్వారా దానిని నిర్ధారణచేసుకోవచ్చు. కొందరు స్త్రీలలో యోనిమార్గంలో వీర్యకణాలు స్థలించబడిన తరువాత అక్కడ ద్రవాల్లోని రసాయనిక సాంద్రత వల్ల కదలకుండా ఆపవచ్చు. అదికూడా గర్భధారణకు అవరోధమే. అటువంటికేసుల్లో సెక్స్ లో పాల్గొన్నతరువాత కొంతవ్యవధిలో యోనిమార్గంలోనుంచి ద్రవాలని తీసుకుని అందులో వార్యకణాల కులికని అంచనావేస్తారు. దీనిని సోస్టకాయిటల్ టెస్ట్ అంటారు.

యోనిమార్గంలో ద్రవాలు సాంద్రతవల్ల వీర్యకణాలు నిల్వీర్వంగా మారుతున్నప్పుడు భర్త వీర్యాన్ని వేరుగాపట్టివేంటనే ఒక ట్యూబుద్వారా గర్భాశయంలోకి ప్రవేశపెడితే గర్భం వచ్చే అవకాశం చాలావరకు వుంది.

ట్యూబులు మూసుకుపోయి అండం ప్రయాణించడానికి అవరోధంవుంటే ట్యూబోప్లాస్టీ సర్జరీ ద్వారా సరిచేసి గర్భధారణకి తోడ్పడవచ్చు.

కొన్ని ఇన్ ఫెక్షన్ గర్భధారణకు అవరోధంగా నిలుస్తాయి. వాటిని గుర్తించి చికిత్స చేస్తే గర్భం వస్తుంది.

స్త్రీకి 18 సంవత్సరాల వయస్సునుంచి 30 సంవత్సరాలవరకు గర్భం తేలికగా, త్వరగా వచ్చే సమయం కనుక ఈ వయస్సులోనే గర్భం వచ్చేటట్లు చూసుకోవాలి. అందుకని గర్భం రానప్పుడు దంపతులిద్దరూ పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

### 16. దాంపత్యం - గర్భధారణ

#### 1. గర్భం రావడానికి పలుమార్లు దాంపత్యంలో పాల్గొనడం అవసరమా ?

జనాభాలో సుమారు 10 శాతం దంపతులు సంతానం కలగక బాధపడుతూ వుంటారు. ప్రపంచ జనాభాలో 80 మిలియన్ల దంపతులు సంతానం కలగని వారని ఒక అంచనా.

సంతానం కలగనప్పుడు దంపతులిద్దరూ డాక్టరుకి చూపించుకున్నప్పుడు ఎవరిలో లోపం వున్నదీ వెంటనే తెలుస్తుంది. దానిబట్టి రెండవవారికి వైద్య పరీక్షలు అనవసరంగా జరపడం వుండదు. దీనివల్ల ధనం, సమయం రెండూ కలిసివస్తాయి.

స్త్రీకి 20-30 సంవత్సరాల వయసులో గర్భం వస్తుంది. ఆ పైన గర్భం రావడం తక్కువ. సాధారణంగా పురుషునిలో ఇటువంటి పరిస్థితి కనబడదు. పురుషుడు ఏ వయస్సులో పాల్గొన్నా అతనివల్ల గర్భం మామూలుగానే వస్తుంది.

రతిలో ఎక్కువసార్లు పాల్గొనేవారిలో గర్భం త్వరగా వస్తుంది. తక్కువ పాల్గొనేవారిలో గర్భం రావడం ఆలస్యం అవుతుంది. వారానికి ఒకసారే రతిలో పాల్గొంటే ఆరునెలల్లో గర్భం వచ్చేవారు 1-2 సార్లు రతిలో పాల్గొనే దంపతులలో 6 నెలలలోగా గర్భం దాల్చేవారు 32 శాతం మంది వుంటారు. వారానికి 2-3 సార్లు పాల్గొనే దంపతులలో 6 నెలలలోగా 46 శాతం మంది గర్భం దాల్చుతారు. వారానికి 4 సార్లు కంటే మించి రతిలో పాల్గొనే

దంపతులు 83 శాతం మంది 6 నెలల్లో సంతాన సాఫల్యత పొందుతారు.

వంధ్యత్వ సమస్య ఎక్కువకాలం వున్నవారు సంతాన సాఫల్యత పొందడం ఆలస్యం అవుతుంది. అందుకని వంధ్యత్వం వున్నవారు ముందుగానే పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం.

## స్క్రీకింగ్ సంతాన సాఫల్యతని తగ్గిస్తుందా ?

పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారిలో సంతాన సాఫల్యత తక్కువ వుంటుంది. పొగత్రాగే స్త్రీలలో వంధ్యత్వ సమస్య తలెత్తడం మరింత ఎక్కువ. అందుకని సంతానం కలగనివారు పొగ త్రాగడం మానివేయాలి.

శారీరకంగా శ్రమ చెందేవారు, వ్యాయామం చేసేవారు, మంచి ఆహారం తీసుకునేవారు, చక్కని ఆరోగ్యం కలవారు త్వరగా సంతానవంతులు అవుతారు. స్థూలకాయం వున్న స్త్రీలు సంతానవంతులు అవడం కాస్త ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే స్థూలకాయం తగ్గడం కోసం అకస్మాత్తుగా ఆహారం బాగా తగ్గించేయడం, అతిగా వ్యాయామం చేయడం, త్వరత్వరగా బరువు కోల్పోవడం మంచిది కాదు.

## డైటింగ్ ఎక్కువ చేస్తే కలిగే నష్టం

ఏదైన నిదానంగా మార్పు రావాలిగానీ, అకస్మాత్తుగా వున్న దాంట్లో మార్పు తీసుకు రావాలనుకుంటే గర్భం దాల్చడం మరింత ఆలస్యం అవుతుంది. అకస్మాత్తుగా ఆహారం తగ్గించేవారిలో అండం విడుదల ఆగిపోతుంది. కొందరిలో రెగ్యులర్ గా నెలనెలా వచ్చే ఋతుస్రావం కూడా కనబడకుండా పోతుంది. అలాగే వున్నట్లుండి వ్యాయామం మొదలు పెట్టి అతిగా చేసేవారిలో బహిష్టు స్రావం బాగా తగ్గిపోతుంది. అండం విడుదలలేకుండా అవుతుంది. అందుకని ఏదైనా తక్కువలో మొదలు పెట్టి నిదానంగా పెంచాలి.

పరీక్షల వల్ల మానసిక ఆందోళన, కుటుంబంలో మానసిక ఒత్తిడి, ఉద్యోగంలో స్ట్రెస్ ఎక్కువవున్న స్త్రీలలో బహిష్టులు సక్రమంగా రావు. అంతేకాకుండా వారిలో అండం విడుదల కూడా అంతగా వుండదు. అందుకని మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా వుండటం ఆలవర్చుకోవాలి.

ఎరువులు, ఇతర రసాయనిక ఒత్తిడిలలో పనిచేసే పురుషులలో సంతాన సాఫల్యత తగ్గుతుంది. ఆ కెమికల్స్ ప్రభావం వ్యషణాల మీద వుంటుంది. దానివల్ల వీర్యకణాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. సంతానం కలగనప్పడు ఇటువంటి ఉద్యోగాలలో వున్నవారు వాటిని మార్చుకోవడం ఎంతైనా అవసరం.

గర్భకోశ వ్యాధులు, పొత్తికడుపు దగ్గర ఇతర వ్యాధులు వున్న స్త్రీలలో సంతాన సాఫల్యత అంతగా వుండదు. ఇటువంటి పరిస్థితిని పి.ఐ.డి. (పెల్విక్ ఇనఫ్లమేటరీ డిసీజెస్) అంటారు. గర్భం రాని 20 శాతం స్త్రీలలో పి.ఐ.డి. కారణం.

సంతానం కలగనప్పడు స్త్రీ విషయంలో ఆమెకు రెగ్యులర్ గా మెన్స్ట్రస్ వస్తున్నది లేనిదీ, ఒకవేళ వస్తూ వుంటే మెన్స్ట్రస్ లో రక్తం బాగా తక్కువలో వెంటెన్నదా అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇటువంటి స్త్రీలలో అండం విడుదల అరుదు. అలాగే ఆ స్త్రీ అతిగా మానసిక ఒత్తిడికి (స్ట్రెస్)కి లోనవుతున్నదేమో తెలుసుకోవాలి. రెగ్యులర్ గా దాంపత్యసంబంధాలలో పాల్గొంటున్నది లేనిదీ తెలుసుకోవాలి. భార్య భర్తల మధ్య అన్యోన్యత వున్నది లేనిదీ. మానసిక ప్రశాంతత వున్నది లేనిదీ గమనించాలి. పురుషునిలో వీర్యకణాల పరిస్థితి, స్త్రీలో అండం విడుదల పరిస్థితి తెలుసుకోవడమే కాకుండా గర్భం రావడానికి కావలసిన ఇతర పరిస్థితులని క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి చికిత్స చేయాలి.

## 17. భార్యభర్తల బ్లడ్ గ్రూపులు

ప్రధానంగా బ్లడ్ గ్రూపులు నాలుగు వున్నాయి. ( ఎ ) గ్రూపు ( బి ) గ్రూపు, ( ఎబి ) గ్రూపు ( ఓ ) గ్రూపు. ఈ గ్రూపులతో పాటు ఆర్.హెచ్ టైపింగ్ కూడా వుంది. ఆర్.హెచ్. టైపింగ్ రెండు రకాలు - ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్, ఆర్.హెచ్.నెగిటివ్.

### బ్లడ్ గ్రూపులు వేరైనా గర్భం వస్తుంది

భార్యభర్తల బ్లడ్ గ్రూపులు వేరైనా మామూలుగానే గర్భం వస్తుంది. భార్య ఆర్.హెచ్.నెగిటివ్ అయివుండి భర్త ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ అయివుండి గర్భంలో ఎదగే బిడ్డకూడా ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ అయినట్లయితే ఓరకమైన సమస్య వస్తుంది. గర్భంలో ఎదగే బిడ్డ ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్ కావడంతో తల్లిలో ఆర్.హెచ్. యాంటీబాడీస్ గర్భస్థ శిశువు మీద దుష్ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.

### ఆర్.హెచ్.నెగిటివ్ తల్లికి ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్ బిడ్డ

ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ తల్లికి ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్తో పుట్టిన మొదటి బిడ్డ కాంప్లికేషన్లతో పుట్టవచ్చు. లేదా ఏ కాంప్లికేషన్లు వుండకపోవచ్చు.

మొదటి కాన్వయినా, ఆ తరువాత కాన్వయినా తల్లి ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ అయివుండి తండ్రి ఆర్.హెచ్ పాజిటివ్ అయి వుండి బిడ్డకూడా ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఆ బిడ్డలో పచ్చ కామెర్లు పుట్టుకతోనే వుండవచ్చు. లేదా కొద్దిగంటలలోనే పచ్చ పచ్చగా మారిపోవచ్చు. ఈ సందర్భంలో పచ్చ కామెర్లని గుర్తించి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకి రక్తం మార్పిడి చికిత్స చేస్తే బిడ్డలో ఏర్పడిన పచ్చ కామెర్లు పోతాయి.

తల్లి ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ అయివుండి, తండ్రి ఆర్.హెచ్ పాజిటివ్ అయివుండి గర్భంలో ఏర్పడిన పిండం కూడా ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ అయితే రెండవసారి గర్భం వచ్చినప్పుడు నెలలు నిండకనే అబార్షన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది.

బిడ్డ ఆర్.హెచ్ పాజిటివ్ అయినదీ తెలుసుకోవడానికి కాన్సుకాగానే బొడ్డుతాడు నుంచి రక్తాన్ని సేకరించి లేబరేటరీలో పరీక్ష చేయాలి.

ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ మదర్ కి ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్ బిడ్డ పుడితేనే ఆ బిడ్డకీ సమస్యలన్నీ వస్తాయి. ఒకవేళ ఆర్.హెచ్ నెగిటివ్ తల్లికి ఆర్.హెచ్ నెగిటివ్ బిడ్డే పుట్టినట్లయితే ఏ సమస్య వుండదు. అలాగే తల్లి ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ తండ్రి ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ అయినప్పుడు కూడా ఎటువంటి సమస్య వుండదు.

### యాంటీ - డి ఇంజక్షన్ అవసరం

ఒకవేళ ఆర్.హెచ్. నెగిటివ్ తల్లికి ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్ బిడ్డ పుట్టడం జరిగితే యాంటీ-డి ఇంజక్షన్-300 మైక్రో గ్రామ్స్ కాన్సు అయిన 72 గంటలలోగా తల్లికి ఇవ్వాలి. దానివల్ల రెండవ సారి గర్భం వచ్చినా తల్లిలో యాంటీ బాడీస్ నష్టం చేయవు.

కొందరిలో మొదటి గర్భమే అబార్షన్ అయిపోతుంది. అలా అబార్షన్ అయినప్పుడు గర్భస్థ శిశువు ఆర్.హెచ్. పాజిటివ్ అయింది కానీ తెలీదు. అబార్షనే కదా అని ఊరుకుంటే గర్భప్రావమైన పిండం ఆర్.హెచ్.పాజిటివ్ అయినట్లయితే తల్లిలో ఆర్.హెచ్.యాంటీ బాడీస్ పెంపొందడం జరుగుతుంది. దానివల్ల తర్వాత వచ్చే గర్భాలు కూడా నిలవకుండాపోయే అవకాశం వుంది. అందుకనే 2వ నెల, 3వ నెలలో గర్భస్రావం జరిగినా ముందు జాగ్రత్తగా యాంటీ-డి ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం అవసరం.

### ఎ.బి. ఓ ఇన్ కంపారిటబిలిటీ.

తల్లి బ్లడ్ గ్రూపు ( బ ) అయివుండి తండ్రి గ్రూపు ( ఎ ) అయివుండి తండ్రి బ్లడ్ గ్రూపు ( ఎ ) గానీ ( బి ) గానీ లేదా ( ఎ బి ) గానీ అయివుండి గర్భస్థ శిశువుకు తండ్రి బ్లడ్ గ్రూపు వచ్చినట్లయితే ( ఎబిఓ ఇన్ కంపారిటబిలిటీ ) వచ్చి వుట్టిన బిడ్డకు పచ్చకామెర్లు 24 గంటలలోగా తీవ్రంగా రావచ్చు వెంటనే గుర్తించి ఎక్స్ డ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ ఫ్యూజన్ ఇవ్వాలి.

### 18. స్త్రీలో అండం విడుదల

అధికశాతం స్త్రీలలో బహిష్టుస్రావం కనబడిన 10వ రోజునుంచి 18వ రోజులోపల అండం విడుదల అవుతుంది. ఎక్కువో చాలా కొద్దిమందిలోనే ఇలా కాకుండా బహిష్టుకి ముందూ-వెనకా ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు.

అండం విడుదల తెలుసుకోవడం కోసం ఏస్త్రీ అయినా బహిష్టుస్రావం కనబడిన మొదటిరోజు నుంచి తిరిగి బహిష్టు కనబడేవరకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం శరీర ఉష్ణోగ్రతని రికార్డు చేయాలి.

తాను నిద్రలేస్తూనే ఇంకా మంచం కూడా దిగకుండా నోట్లో ధర్మామీటరు పెట్టుకోవాలి. అలా పెట్టుకున్న ధర్మామీటరుని రెండునిమిషాలు నోట్లో వుంచుకోవాలి. ఆ తరువాత ధర్మామీటరులో ఎంత టెంపరేచరు వున్నదీ చూడాలి. ఇలా చూపిన టెంపరేచరుని ఒక కాగితం మీద నోట్ చేయాలి. ఏ రోజుకారోజు బహిష్టుస్రావమై అప్పటికి ఎన్నో రోజో, ఏ తారీఖో ఆనాటి టెంపరేచర్ కి ఎదురుగా నోట్ చేయాలి.

సాధారణంగా మొదటి కొద్దిరోజులు శరీర ఉష్ణోగ్రత 97.6 లేదా 98 డిగ్రీల ఫారన్ హెట్ వుంటుంది.

### అండం విడుదలతో పెరిగే శరీర ఉష్ణోగ్రత

ఇలా వుండగా నెలమధ్యలో అకస్మాత్తుగా టెంపరేచర్ 98.6 లేదా 99 డిగ్రీలుకి పెరుగుతుంది. అలా సడన్ గా పెరిగిన టెంపరేచర్ 10-12 రోజులపాటు కొనసాగుతుంది. ఆ తరువాత తగ్గిపోయి రెండుమూడురోజుల్లో బహిష్టుస్రావం కనబడుతుంది.

ధర్మామీటరులో అకస్మాత్తుగా టెంపరేచర్ పెరిగిన రోజు అండం విడుదల జరిగిన రోజు. అండం విడుదలైన రోజు నుంచి శరీరం ఉష్ణోగ్రత కనీసం అర డిగ్రీ ఎక్కువ అవుతుంది. సాధారణంగా ఒక డిగ్రీ ఎక్కువ వుంటుంది. డిగ్రీ లేదా అర డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికి అండం విడుదలతో ఆమెలో ప్రాజిస్టిరోన్ హార్మోన్ అధికంగా ఉత్పత్తి కావడం కారణం.

ప్రాజెస్టిరోన్ హార్మోన్ కి శరీరంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతని కలిగించే గుణం వుంది. అందుకే అండం విడుదలతో శరీరం ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది.

శరీరం ఉష్ణోగ్రతని రోజూ ధర్మామీటరుతో కొలిచి నోట్ చేస్తున్నప్పుడు కొందరు స్త్రీలలో ఒక వింత పరిస్థితి కూడా కనబడుతుంది. అకస్మాత్తుగా నెలమధ్యలో ఆరడిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత డౌన్ అయిపోతుంది. మరుసటిరోజు అదే స్త్రీలో అంతకుముందు కీడింగ్ కంటే డిగ్రీ లేదా ఆరడిగ్రీ మామూలుగా కంటే ఎక్కువ అవుతుంది.

## అండం విడుదల కలిగించే కడుపు నొప్పి

కొందరు స్త్రీల విషయంలో అకస్మాత్తుగా శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగినట్లు కనబడినరోజున పాత్రికడుపులో కొద్దిగా నొప్పి అనిపిస్తుంది. మరికొందరిలో కొద్ది రక్తపుచుక్కలు యోనిదగ్గర బట్టకు అవుతాయి. ఇవన్నీ ఆమెలో అండం విడుదలైన చిహ్నాలే.

స్త్రీకి గర్భం రావడం జరిగితే పెరిగిన శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గకుండా కంటిన్యూ అవుతుంది. అందుకనే గర్భం దాల్చిన తొలిదినాల్లో కొందరు స్త్రీలు తమ ఒళ్ళు వెచ్చగావుందని, జ్వరం వచ్చినట్లు ఆదోలా వుందని అంటారు.

అండం విడుదలైనా గర్భం దాల్చడం జరగకపోతే ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన 10-12 రోజుల్లో తిరిగి శరీర ఉష్ణోగ్రత పూర్వం స్థాయికి పడిపోతుంది. అండం విడుదల లేనివాళ్ళలో నెలంతా శరీర ఉష్ణోగ్రత మార్పులేకుండా ఒకే విధంగా వుంటుంది.

నెల నెలా శరీర ఉష్ణోగ్రత పట్టికలని తయారుచేయడం వల్ల స్త్రీకి నెలనెలా సక్రమంగా అండం విడుదల అవుతున్నదీ లేనిదీ తెలుస్తుంది. అలాగే బహిష్టు అయిన తరువాత ఎన్నిరోజులకి అండం విడుదల అవుతున్నదీ స్పష్టంగా తెలుతుంది.

సాధారణంగా ప్రతినెలా ఒకే సమయంలో అండం విడుదల అవుతుంది. దీన్ని బట్టి అన్నీ సక్రమంగా వుండి గర్భం రానివాళ్ళు తమంతట తాము అండం ఏ రోజుల్లో విడుదల అవుతున్నదో తెలుసుకుని ఆ దినాల్లో మిస్ అవకుండా దాంపత్యంలో పాల్గొనవచ్చు.

## నెలలో ఎన్ని అండాలు విడుదలవుతాయి ?

స్త్రీలో కుడివైపు ఒక ఓవరీ, ఎడమవైపు మరొక ఓవరీ వుంటాయి. ఒక నెల ఒక వైపు ఓవరీ నుంచి అండం విడుదలైతే మరొక నెల రెండవవైపు ఓవరీ నుంచి అండం విడుదల అవుతుంది. అది కూడా ఒకటే అండం. ఆ అండం కూడా నెలకి ఒకసారే. విడుదలైన అండానికి వీర్యకణంతో సంయోగం చెంది పిండంగా మారే శక్తి 12 నుంచి 24 గంటలు మాత్రమే వుంటుంది.

పై విధంగా అండం విడుదల ఎవరు మటుకువారు తెలుసుకోవడం వుండగా బహిష్టుకిముందు చిన్నాపరేషన్ చేసి దానిద్వారా వచ్చే ఎండోమెట్రియం బిట్స్ ని హిస్టాపథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఆ స్త్రీలో అండం విడుదల అవున్నదీ లేనిదీ తెలుస్తుంది.

అలాగే బహిష్టు అయిన 10వ రోజు నుంచి రోజూ ఆల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తే ఒవరీస్ నుంచి అండం విడుదల అవడం కూడా తెలుస్తుంది.

## 1. పిల్లలు కలగనప్పుడు చిన్నాపరేషను

చిన్నాపరేషన్ స్త్రీకి గర్భం రావడానికి అసలైన ఆపరేషన్ కాదు. చిన్నాపరేషన్ (డి అండ్ సి) వల్ల గర్భాశయం లోపల టిష్యూలు ఆరోగ్యవంతంగా, చైతన్యవంతంగా మారి త్వరగా గర్భం వచ్చే అవకాశం వుంది.

చిన్నాపరేషను చేసి దాని ద్వారా వచ్చిన ఎండోమెట్రియల్ బిట్స్ ని హిస్టోపథాలజీ ఎగ్జామినేషన్ కి పంపిస్తే ఆ టిష్యూలో కనబడే మార్పులను బట్టి ఆమెలో అండం విడుదల వున్నదీ లేనిదీ తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా గర్భాశయం పొరల్లో గర్భధారణకి అవరోధం కలిగించే వ్యాధులుంటే తెలుస్తుంది. అటువంటి చికిత్స చేస్తే ఆ లోపం సరిదిద్దబడి గర్భం వచ్చే అవకాశం వుంది.

## సూది బెజ్జం కంటే సన్నగా ఉండే గర్భాశయం మార్గం

కొందరు స్త్రీలలో గర్భాశయకంఠంలోని మార్గం సూదిబెజ్జంకంటే చాలా సన్నదిగా వుంటుంది. ఇటువంటి వారికి బహిష్టు అయిన తర్వాత డి అండ్ సి చేసి మార్గాన్ని వెడల్పు చేస్తే వీర్యకణాలు లోపలికి వెళ్ళడానికి మార్గం సులభం అవుతుంది.

కొందరికి గర్భాశయం చిన్నదిగా వుంటుంది. లేదా ఓవలీస్ కి సిస్ట్ వుంటాయి. అండవాహికలు నీరుసోసుకుని ఉబ్బివుంటాయి. ఇవన్నీ గర్భం రాకపోవడానికి కారణాలు. పెళ్ళైనా గర్భం రానప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయించుకుంటే పై లోపాలేమైనా వుంటే తెలుస్తుంది.

కొందరిలో కొన్ని కారణాల వల్ల అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు మూసుకుని పోతాయి. దానివల్ల అండం ప్రయాణించడం కుదరక గర్భం రాదు. మరి ట్యూబులు మూసుకుని వున్నాయా, మామూలుగా వున్నాయా తెలుసుకోవడానికి హిస్టోసాల్పింగో గ్రామ్ ఎక్స్ ప్లరే తీస్తే తెలుస్తుంది.

## పిల్లలు పుట్టనివారిలో పరీక్షలు

గర్భం రాని స్త్రీకి సాధారణంగా జరిపే వైద్యపరీక్షలకి తోడు అవసరంబట్టి పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్, హార్మోన్ల ఎస్టిమేషన్, శుభ్రత, యు.జి.ఎస్.ఎస్.ఎస్. సీరం ప్రోలాక్టిన్ ఎస్టిమేషన్ చేయవలసి వుంటాయి. వంధ్యత్వం వున్న ప్రతీ స్త్రీలోనూ ఈ పరీక్షలన్నీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అవసరం బట్టి చేయవలసి వుంటుంది.

హిస్టోసాల్పింగో గ్రఫీ, లాప్రోస్కోపీ, హిస్టోస్కోపీ పరీక్షలు స్త్రీలో సంతానం కలగకపోవడంలో లోపాల్ని కనుగొనడానికి తోడ్పడతాయి. హిస్టోసాల్పింగో గ్రామ్ ఎక్స్ ప్లరే ద్వారా గర్భాశయం లోపల ఎలా వున్నదీ, గర్భాశయం చిన్నదా పెద్దదా, అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు, ఫెంబ్రియా మూసుకుని వున్నదీ లేనిదీ తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తరువాత అవసరం బట్టి లాప్రోస్కోపీ చేయవలసి వుంటుంది.

ఈ రోజుల్లో లైంగిక వ్యాధుల వల్ల, ఇతర వ్యాధుల వల్ల అండం ప్రయాణించే ఫెల్లోయస్ ల్యూబులు వ్యాధిగ్రస్తం కావడం (సాల్పింజైటిస్) కూడా ఎక్కువగా వుంటోంది. గర్భాశయం ట్యూబులకి క్షయవ్యాధి సోకడం కూడా జరుగుతూ వుంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిని లాప్రోస్కోపీ ద్వారా తేలికగా గుర్తించవచ్చు.

## 20. స్త్రీలలో ట్యూబులు మూసుకుపోతే గర్భం రాదా ?

కొందరు స్త్రీలలో నెల నెలా బహిష్టులు సక్రమంగానే వస్తాయి. అండం విడుదల కూడా మామూలుగానే వుంటుంది. హార్మోన్ల ఉత్పత్తిలో కూడా ఎటువంటి తేడా వుండదు. ఆరోగ్యం కూడా బాగానే వుంటుంది. పురుషునిలో కూడా ఎటువంటి లోపమూ వుండదు. అయినా ఎంతకీ గర్భం రాదు. అందుకు కారణం ఇటువంటి వారిలో అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు (ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్) మూసుకుపోవటమే.

స్త్రీలలో గర్భకోశ వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ( అండ వాహికలు ) మూసుకుపోతాయి.

### గర్భస్రావాలు వల్ల మూసుకుపోయే ట్యూబులు

కొందరిలో గర్భస్రావాలు జరిగినప్పుడు, అబార్షన్లు చేయించుకున్నప్పుడు, కాన్పులయినప్పుడు వ్యాధిక్రిములు అండవాహికల్లోకి చేరి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిస్తాయి. అండవాహికల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కలిగినప్పుడు ట్యూబులు మూసుకుపోయే అవకాశం వుంది. అందుకనే కొందరు స్త్రీలలో ఒక్కసారి గర్భం వచ్చి ఆ తరువాత మళ్ళీ గర్భం రాని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

ఈ పరిస్థితిలో వారికి తెలియకనే అబార్షన్ అయినప్పుడు, కాన్పులయినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ రావటం, ట్యూబులు మూసుకుపోవటం జరుగుతుంది.

ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు జ్వరం రావటం, పొత్తికడుపులో నొప్పి అనిపించటం జరుగుతాయి. అటువంటప్పుడు వెంటనే తగిన యాంటీబయాటిక్ మందులు వారం పదిరోజుల కోర్సుగా వాడతే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ట్యూబులు మూసుకుపోవటం వుండదు. అయితే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ చెప్పదగ్గ జ్వరం రావటం పొత్తికడుపు నొప్పి రావటం వుండకపోవచ్చు.

### సుఖవ్యాధుల కలిగించే నొప్పం

కొందరు స్త్రీలలో గర్భం రాకుండానే గనేరియా వంటి సుఖవ్యాధులు సంక్రమించి ట్యూబులు మూసుకుపోతాయి. గనేరియా వచ్చినవారిలో మూత్రం మాటిమాటికి రావటం. మూత్రంతో చీము కారటం, యోనినుండి దుర్గంధంతో కూడిన తెలుపు అవటం. దుస్తులపై వచ్చని మరకలు పడటం వంటి లక్షణాలుంటాయి.

చాలామంది స్త్రీలు ఈ లక్షణాలని వేడి చేసిందని భావించి చలవకని ఏవేవో తాగుతూ నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కొన్ని రోజులకి వ్యాధి దానంతటకదే తగ్గిపోవచ్చు. కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు మూసుకుపోవటం సర్వ సాధారణం ట్యూబులు మూసుకున్నదీ లేనిదీ తెలుసుకోవడానికి హిస్ట్రోసాల్పింగ్ గ్రామ్ ఎక్స్రే వద్దతి బాగా తోడ్పడుతుంది.

అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు మూసుకుపోయినదీ లేనిదీ తెలుసుకోవడానికి ట్యూబు టెస్టింగ్ చేస్తే వెంటనే తెలుస్తుంది. హిస్ట్రోసాల్పింగ్ గ్రామ్ చేసినప్పుడు ఒకవిధమైన ద్రవాన్ని గర్భాశయంలోకి సిరంజి ద్వారా ఎక్కిస్తారు. ఆ తర్వాత వెంటనే ఎక్స్రే తీయటం జరుగుతుంది. ఆ ఎక్స్రేలో గర్భాశయమా, దానికి రెండు పక్కలా వుంటే ట్యూబులు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. హిస్ట్రోసాల్పింగ్ గ్రామ్ ఎక్స్రేలో గర్భాశయం, ట్యూబులు కనబడితే చాలదు. గర్భాశయంలోకి ఎక్కించిన ద్రవం ట్యూబుల కొనలనుంచి పొత్తి కడుపులోకి కారాలి. అలా కాలిన ద్రవం ఎక్స్రేలో

కనబడాలి. కనబడకపోయినట్లయితే ట్యూబుల చివర మూసుకుపోయినట్లు నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువమందిలో ట్యూబుల మధ్యలో మూసుకుపోతాయి. ఇలా ట్యూబుల కొసల్లో మూసుకుపోయిన వారికి గర్భం రాదు.

కొందరి విషయంలో గర్భాశయానికి ఒక వైపు ట్యూబు మాత్రమే మూసుకుపోవటం జరుగుతుంది. రెండవ ట్యూబు బాగానే వుంటుంది. అటువంటప్పుడు గర్భం రావడానికి అవకాశం వుంటుంది. కొందరిలో గర్భాశయానికి రెండువైపులా వుండే ట్యూబులు రెండూ మూసుకు పోతాయి. అటువంటప్పుడు గర్భం వచ్చే అవకాశం వుండదు.

## సర్జరీ ద్వారా తిరిగి తెరుచుకునే ట్యూబులు

హిస్ట్రోసాల్పింగో గ్రామ్ ద్వారా ట్యూబులు మూసుకుపోయినవారిలో సర్జరీ ద్వారా లోపాన్ని సరిచేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. దానివల్ల కొందరికి గర్భం వస్తుంది. ట్యూబులు పూర్తిగా మూసుకుపోయినవారిలో మందుల ద్వారా ప్రయోజనం ఏమీ వుండదు. సర్జరీ ఒక్కటే మార్గం.

## 2.1. సంతానం కలగకపోవడంలో సెక్స్ ప్రాబ్లమ్

సంతానం కలగడానికి సెక్స్ లో పాల్గొంటే సరిపోదు, అండం విడుదల సమయంలో సెక్స్ లో పాల్గొనడం అవసరం. స్త్రీకి నెలలో ఒకసారే అండం విడుదల అవుతుంది. అలా విడుదలైన అండానికి వీర్యకణంతో కలయిక చెంది పిండంగా మారే పరిస్థితి ఒకరోజు మాత్రమే వుంటుంది.

కొందరు పురుషులు వత్తిలిత్యానో, వ్యాపారం లిత్త్యానో తరచు టూర్లో వుంటారు. అందువల్ల సెక్స్ లో రెగ్యులర్ గా పాల్గొనడం జరగదు. వీరు ప్రతి నెలా అండం విడుదల సమయంలో సెక్స్ లో పాల్గొనడం మిస్ అవుతుంటారు. అటువంటి దంపతులు సెక్స్ లో పాల్గొనడం వున్నా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గర్భం రాదు.

## అండం విడుదలయ్యే దినాల్లో సెక్స్ లో పాల్గొనకపోతే

దంపతులిద్దరూ ఉద్యోగం చేసేవారైతే, చెరోక ఊరులో వుంటే దాంపత్యంలో పాల్గొనడమే అపురూపం అయిపోతుంది. ఇక అటువంటప్పుడు గర్భం దాల్పడమే వుండదు.

సాధారణంగా నెలనెలా బహిష్టు అయ్యే స్త్రీలలో బహిష్టుస్నావం కనబడిన | ౦వ రోజు నుంచి | ౪వ రోజువరకు గర్భం వచ్చే దినాలు. గర్భం కావాలనుకున్నప్పుడు తక్కిన దినాల్లో పాల్గొన్నా పాల్గొనకపోయినా ఈ పిరియాడ్ లో తప్పకుండా పాల్గొనాలి.

ఈ పిరియాడ్ లో రోజూ కాకున్నా రోజు విడిచి రోజైనా పాల్గొనాలి. ఒకసారి విడుదలైన అండానికి కలయిక చెందే శక్తి 24 గంటలే వున్నా, వీర్య కణాలకి 48 నుండి 72 గంటలుంటుంది. అందుకని ఒకసారి స్థలించబడిన వీర్యకణాలు 2 రోజులు యోనిలో యాక్టివ్ గా వుంటాయి.

కొందరు పురుషుల పరిస్థితి వింతగా వుంటుంది. గర్భం రావాలంటే | ౦వ రోజునుంచి | ౪వ రోజువరకు తప్పకుండా రతిలో పాల్గొనాలని చెబితే తక్కిన రోజుల్లో చక్కగా సెక్స్ లో పాల్గొనగలుగుతూ సరిగ్గా ఆ వారం రోజులు

సెక్స్ లో పాల్గొనలేకుండా అవుతారు. వారు ఎంత ప్రయత్నించినా అంగం గట్టిపడదు. అంగప్రవేశం జరగదు. దానికి కారణం అవసరమైన సమయంలో సెక్స్ చేయగలమా లేమా అని వారిలో అనవసరమైన ఆందోలన పెంపొందడమే.

## శీఘ్రస్థలనం సమస్య సెక్స్ కి అవరోధమా ?

కొందరు పురుషులలో శీఘ్రస్థలనం సమస్య అతి తీవ్రంగా వుంటుంది. వారిలో అంగం చక్కగానే స్తంభిస్తుంది. తీరా యోనిలోకి అంగప్రవేశం జరపబోయే సమయానికి స్థలనం అయిపోతుంది. వీర్యం బయటే పడిపోతుంది. ప్రతిసారి ఇదే పరిస్థితి ఎన్ని రోజులైనా, ఎన్ని నెలలైనా ఇలాగే అవడంతో గర్భం రావడం జరగదు. కొందరు స్త్రీలు సెక్స్ లో పాల్గొన్నా ఎటువంటి అనుభూతి పొందరు. ఎటువంటి థ్రిల్ అనిపించదు.

సెక్స్ పాల్గొన్నప్పుడు ఎటువంటి సుఖం అనిపించకపోయినా ఆ సమయంలో అండం విడుదల వుంటే గర్భం వస్తుంది. అయితే సెక్స్ పరంగా స్పందించే స్త్రీలో త్వరగా గర్భం వస్తుంది. దానికి కారణం యోనిలో ద్రవాలు చక్కగా ఊరడం, ఆ ఐరిన ద్రవాలు వీర్య కణాల రక్షణకి, వాటి కదలికకి తోడ్పడటమే.

కొందరు స్త్రీలలో ఎప్పుడూ ఆందోళన కలుగుతూ వుంటుంది. సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా అనవసరంగా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారు.

ఇలా యాంర్జయిటీ, టెన్షన్ ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యేవారిలో గర్భం రావడం ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం వుంది. టెన్షన్, యాంర్జయిటీ ఫీల్ అయితే అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు స్వాజమ్ కి లోను అవుతాయి. ఫెల్లోపియన్ ట్యూబులు స్వాజమ్ కి లోనైతే అండం ప్రయాణించడంలో అవరోధం కలుగుతుంది.

## డిప్రెషన్ తో సెక్స్ ఇంట్రస్ట్ జీరో

కొందరు పురుషులలో డిప్రెషన్ వుంటుంది. డిప్రెషన్ వల్ల సెక్స్ లో ఆసక్తి వుండదు. సెక్స్ లో ఆసక్తి లేకపోవడంతో సెక్స్ లో పాల్గొనడం వుండదు. అటువంటప్పుడు అన్నీ బాగున్నా గర్భం రాదు.

సంతానం కలగనప్పుడు సెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా దృష్టిలో వుంచుకోవాలి. దంపతులు కూడా డాక్టర్ తో తమ సెక్స్ సంబంధిత విషయాలని దాపరికం లేకుండా చెప్పాలి. సెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని చాలా వరకు సరిదిద్దడానికి వీలు అవుతుంది. సెక్స్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చాలా సమస్యలని పరిష్కరించవచ్చు. ఆ పైన సక్రమంగా సెక్స్ లో పాల్గొనేటట్లు చేయవచ్చు. ప్రిమెచ్యూర్ ఇజాక్యూలేషన్ (శీఘ్రస్థలనం) సమస్యల వల్ల వీర్యం బయటే పడిపోతున్నవారికి ఆ సమస్యని సరిదిద్దవచ్చు.

సమస్య పరిష్కారమయ్యేలోగా వీర్యాన్ని వేరుగా కలెక్టుచేసి అండం విడుదలయ్యే దినాల్లో యోనిలకి ఎక్కిస్తే గర్భం వస్తుంది. దీనినే ఆర్బిఫిషియల్ ఇన్ సెమినేషన్ అంటారు.

## 22. సంతానం కలగకపోవడంలో పురుషుని పాత్ర

గర్భం రావడానికి పురుషుడు రెగ్యులర్ గా దాంపత్యంలో పాల్గొనాలి. తరచు గనేలయూ వంటి సుఖవ్యాధులకి గురి అవుతున్నా, మూత్రసంబంధిత వ్యాధులు వస్తున్నా గర్భం రాదు. వ్యషణాలకి దెబ్బతగలడం, ఇన్ ఫెక్షన్ రావడం వాపు ఉన్నట్టయితే వీర్యకణాల ఉత్పత్తి దెబ్బతినే అవకాశం వుంది.

### బిగని వ్యషణాలు, కలగని సంతానం

కొందరు పురుషులలో వ్యషణాలు బీజకోశంలో కాకుండా, పాత్తికడుపు దగ్గర వుంటాయి. మరికొందరిలో వ్యషణాలు చింతపిక్కలంత చిన్నవిగా వుంటాయి. ఇటువంటివారు సెక్స్ లో సమర్థవంతంగా పాల్గొనగలుగుతారు కానీ, సంతాన సాఫల్యత వుండదు. కొందరు పురుషులకి మూత్రద్వారం పురుషాంగం చివర్లో కాకుండా మొదట్లో వుంటుంది. ఇటువంటి వారికి మూత్రం, వీర్యం అక్కడ నుంచే వుంటుంది.

వీరిలో అంగప్రవేశం ఇబ్బందిలేకపోయినా మూత్రద్వారం పురుషాంగం మొదట్లోనే వుండబట్టి వీర్యమంతా యోని బయటే పడిపోతుంది.

సంతానం కలగనప్పుడు పురుషుని వీర్యం ఒక్కటే పరీక్షచేస్తే చాలదు. పురుషాంగం, వ్యషణాలు ఎలా వున్నవీ నిశితంగా పరీక్షించాలి. అలాగే వీర్యంలో వీర్య కణాలు ఎన్ని వున్నవీ, ఎలా వున్నవీ చూడాలి.

### మద్యం, మత్తు పదార్థం తేచ్చే ముప్పు

కొందరు పురుషులకు మద్యం, మత్తు పదార్థాలు, స్మోకింగ్ అలవాట్లు వుంటాయి. ఇవి కూడా వీర్య కణాల ఉత్పత్తిని దెబ్బతీస్తాయి. దానివల్ల సంతానం కలగ కుండా పోతుంది.

పురుషులలో వీర్యకణాల ఉత్పత్తి లేనప్పుడుగానీ, తక్కువగా వున్నప్పుడుగానీ కొందరిలో కొన్ని రకాల హార్మోన్ల లోపం కూడా వుంటుంది. అటువంటి లోపం వుందని అనుమానం కలిగినప్పుడు పరీక్షలు జరిపి ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దితే చాలావరకు ఫలితం వుంటుంది. అవసరం బట్టి తగిన మోతాదులో, తగిన కోర్సుగా టెస్టోస్టిరోన్, గొనాడోట్రాఫిన్ ఇంజెక్షన్లు వాడవలసి వుంటాయి.

### వీర్యకణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడే హార్మోన్ల ఇంజెక్షన్లు

వీర్యంలో వీర్యకణాలు తక్కువగా వున్నప్పుడు హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొనాడోట్రాఫిన్ 2000 ఇంజెక్షన్లు వారానికి రెండు చొప్పున 3 నుంచి 6 నెలలు వాడవలసి వుంటాయి. లేదా హ్యూమన్ మెనోపాజల్ గొనాడోట్రాఫిన్ ఇంజెక్షన్లు 75 వారానికి 3 ఇంజెక్షన్లు చొప్పున 3 నుంచి 6 నెలలు వాడవలసి వుంటుంది.

సాధారణంగా 75 శాతం మందిలో వీర్యకణాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఇలా పెరిగినవారిలో సగం మందికి సంతాన సాఫల్యత కలుగుతుంది. అయితే అవసరం బట్టి కొందరికి గొనాడోట్రాఫిన్ లీజింగ్ హార్మోను ఇంజెక్షన్లు వాడవలసి వస్తాయి.

అరుదుగా కొందరు పురుషులలో తమ వీర్యకణాలకే యాంటీబాడీస్ తయారై వీర్యకణాలని దెబ్బతీస్తాయి. స్పెరమ్ యాంటీబాడి టైటర్ ద్వారా దాన్ని గుర్తించి ప్రెడ్డిసాలోన్ టాబ్లెట్లని కోర్సుగా కొంతకాలం ఇచ్చి చికిత్స చేయవలసి వుంటుంది.

వృషణాలు మామూలు పరిమాణంలోనే వుండి వీర్యంలో వీర్యకణాలు లేనప్పుడు లేదా బాగా తక్కువగా వున్నప్పుడు టెస్టిక్యులర్ బయాప్సీ తీసి చికిత్స చేయడం అవసరం.

### 23. గర్భం రావడానికి వీర్యకణాల సంఖ్య ముఖ్యమా ?

గర్భం రాకపోవడానికి స్త్రీలెంత కారణమో, పురుషులూ అంతే. పురుషునిలో వీర్యస్థలనం వున్నా అందులో వీర్యకణాలు వుండకపోవచ్చు. ఒకవేళ వున్నా తగినన్ని లేకపోవచ్చు. పైగా చక్కని కదలిక లేకపోవచ్చు. ఇటువంటప్పుడు స్త్రీలో అంతా చక్కగా వున్నా గర్భం రాదు.

### **వీర్యం పలచగా ఉంటే గర్భం రాదా ?**

వీర్యం పలచన, చిక్కనబట్టి గర్భం రావడం ఆధారపడిలేదు. సాధారణంగా పురుషుడు స్థలించే వీర్యం 2 నుంచి 5 ఎం. ఎల్. వుంటుంది. అలా స్థలించిన ప్రతీ యం.యల్. లో 60 నుంచి 120 మిలియన్ల వీర్య కణాలు వుంటాయి. ఇంతకంటే ఎక్కువ కూడా వుంటాయి. చక్కని సంతాన సాణల్యత కలిగిన వీర్యంలో అన్ని వీర్యకణాలూ చక్కని కదలిక, చక్కని రూపాన్ని కలిగి వుంటాయి.

ఎవరిలోనైనా వీర్యం కనీసం 2 యం.యల్. వుండి, ప్రతీ యం.యల్. కి 60 మిలియన్ వీర్యకణాలు వుండి, 6-8 గంటల తరువాత కూడా వాటిల్లో కనీసం 40 శాతం చక్కని కదలిక కలిగి వుంటేమో, మొత్తం వీర్యకణాల్లో 80 శాతం వీర్యకణాలు అసహజ రూపులేకుండా సహజలితిలో వుంటేనూ, ఆ వీర్యం గర్భధారణ సామర్థ్యం కలిగినదిగా పేర్కొంటారు.

ఒకవేళ వీర్యం 1-2 యం.యల్.కి మించకుండా, ప్రతీ యం.యల్.కి 30 మిలియన్లు లేదా ఇంకా తక్కువ వుంటేనూ, 6-8 గంటల తరువాత వీర్యకణాలు 30 శాతమే చైతన్యవంతంగా వుంటే, 50 శాతం వీర్యకణాలు అసాధారణ రూపం కలిగి వుంటే ఆ వీర్యాన్ని మోడరేట్ ఫెర్టిలిటీ ( ఒక మాదిరి గర్భధారణ సామర్థ్యం ) కలిగినదిగా పేర్కొంటారు.

వీర్యం 1 యం.యల్. కంటే తక్కువ వుండి, ఒక యం.యల్. కి 10-30 మిలియన్లు వీర్యకణాలు వుండి, 6-8 గంటలు గడిచిన తరువాత 30 శాతం కంటే తక్కువ వీర్యకణాలు చైతన్యం కలిగి వుండి, 50 శాతం కంటే ఎక్కువ అసాధారణ వీర్యకణాలు వుంటే ఆ వీర్యం చాలా తక్కువ గర్భధారణ శక్తి కలిగినదానిగా పేర్కొంటారు.

### **గర్భం రావడానికి ఎంత వీర్యం ఉండాలి ?**

అందుకని త్వరగా, సులువుగా గర్భం రావడానికి వీర్యం కనీసం 2 యం.యల్. వుండాలి. 1 యం.యల్. లో 60 మిలియన్లు వీర్యకణాలు వుండాలి.

అంతే కాకుండా వాటిల్లో 80-90 శాతం బాగా చైతన్యవంతంగా వుండాలి. వీర్యకణాలు 20 శాతానికి మించి వుండకూడదు.

కొందరికి పుట్టుకతోనే క్రోమోజోమ్స్లో అసాధారణ పరిస్థితి వుండి వ్యషణాలు వీర్యకణాలని ఉత్పత్తి చేయవు. కొందరు పురుషులలో మశూచి, గవద బిళ్ళలు, పాంగు విషజ్వరాలు రావడం వల్ల వ్యషణాలు వాచి శాశ్వతంగా వీర్యకణాల ఉత్పత్తి లేకుండా అవుతుంది.

వ్యషణాలకి క్షయ, లెప్రోసి, గనేరియా వచ్చినా, ఇతరత్రా కంతులు వచ్చినా వీర్యకణాల ఉత్పత్తి దెబ్బతినవచ్చు. వ్యషణాలు బీజకోశంలోకి దిగకుండా పొత్తికడుపుపైనే వుండిపోయిన వారిలో వీర్యకణాల ఉత్పత్తి దెబ్బతినవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ గర్భధారణకు అవరోధం కలిగిస్తాయి.

కొందరికి బీజకోశంలో రక్తనాళాలు ఉబ్బి వీర్యకణాల ఉత్పత్తి బాగా తగ్గిపోతుంది. బీజకోశంలో రక్తనాళాలు ఉబ్బడాన్ని వేరికోసీల్ అంటారు. వేరికోసీల్ వుండి, వీర్యకణాల ఉత్పత్తి తక్కువ వున్నప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాలి. వేరికోసీల్ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల వీర్యకణాల సంఖ్య పెరగడం, కదలిక పెంపొందడం జరిగి సంతానం కలిగే అవకాశం వుంది.

### అకస్మాత్తుగా వీర్యకణాలు తగ్గిపోవచ్చా ?

అంతకుముందు కొందరికి వీర్యకణాలు బాగానే వుండి ఏ కారణం లేకుండా తగ్గిపోవచ్చు. ఇటువంటిప్పుడు మంచి పోషకాహారం తీసుకోవడం, చన్నిళ్ళ స్నానం చేయడం, వ్యషణాలకి చల్లనిగాలి తగిలేటట్లు నూలు దుస్తులు వాడటం, ఉలెన్ - నైలాన్ డ్రాయర్లు మానివేయడం - ఇలా చేస్తే కొద్దినెలల్లోనే వీర్యకణాల సంఖ్య తిరిగి పెరుగుతుంది. పరిస్థితి మెరుగవుతుంది.

వీర్యకణాలు లేనివారు, తక్కువ వున్నవారు పరీక్ష చేయించుకునేటప్పుడు కనీసం 3 రోజులు రతిలో పాల్గొనకుండా వుండాలి. అలా 3 రోజులు ఆగి చేయించుకున్న పరీక్షలో వీర్యకణాలు కనబడవచ్చు. వీర్యన్ని ఒక శుభ్రమైన బీకరులోగానీ, సీసాలోగానీ సేకరించి అరగంటలోగా పరీక్షచేయించుకోవాలి. పరీక్ష ఆలస్యమైనకొద్దీ రిపోర్టు తప్పు అవుతుంది.

## 24. గర్భం - కాన్పు

### 1. వేవిళ్ళు

గర్భం దాల్చిన మొదటి మాసాల్లో 50 శాతం స్త్రీలలో వికారం అనిపించడం, ఏమీ తినాలని అనిపించకపోవడం, తింటే వాంతి అవుతుందనిపించే లక్షణాలు ఉంటాయి.

వికారం, వాంతులు ఎక్కువగా ఉదయం పూట అనిపిస్తాయి. గర్భిణిలో నెలతప్పిన మొదటి నెలలో కనబడే ఈ లక్షణాలని వేవిళ్ళుగా పేర్కొంటారు. వైద్యబాషలో దీనిని మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటారు.

### వేవిళ్ళు ఏ నెలలో మొదలవుతాయి ?

కొందరు స్త్రీలలో వేవిళ్ళు 1-2 నెలలు మాత్రమే కనబడితే మరికొందరిలో 4-5 నెలలు నిండేవరకు వుంటాయి. దానివల్ల ఏమీ తినాలనిపించకపోవడం, నీరసం అనిపించడం, ఎప్పుడూ పడుకోవాలనిపించడం, ఏదో అనారోగ్యం వున్నట్లు, లోజర్వంవున్నట్లు ఫీలవడం జరగుతాయి. కొందరికి ఈ బాధలు కొద్దిగానే వుండి ఏమందువేసుకోనవసరం లేదనిపిస్తే మరికొందరికి వేవిళ్ళు తగ్గడానికి మందులు వాడాల్సివస్తుంది.

## వేవిళ్ళు బాధ తగ్గాలంటే

వేవిళ్ళు ఉండి వికారం, వాంతులు వున్నప్పుడు రోజూ రాత్రిపూట పి.యన్.వి. బిళ్ళలుగానీ ఎవోమిన్, ఎమిడాక్సిన్, డొమిస్టాల్, ప్రెగ్నిడాక్సిన్ బిళ్ళలలో ఏదో ఒకటి రాత్రి పూట పడుకునే ముందు రోజూ వేసుకోవాలి. ఒక బిళ్ళకి వికారం, వాంతులు తగ్గకుండా వుంటే రెండు బిళ్ళలు వాడాలి. అవసరం బట్టి ఉదయం, సాయంత్రం కూడా వాడాలి.

వేవిళ్ళు వున్నవారికి నీరసం రాకుండా హాల్లెక్స్, గ్లూకోజ్, తేనె, పళ్ళరసం, కొబ్బరినీళ్ళు లాంటివి రోజుకి 3-4 సార్లు ఇవ్వాలి.

మామూలుగా కనబడేవేవిళ్ళు గర్భిణీకి ఎటువంటి హానికలుగదు. మనస్సుని ప్రశాంతంగా వుంచుకుంటూ విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. సాధారణంగా వాడే మందుబిళ్ళలతో సరైపోతుంది.

## అతిగా ఉండే వేవిళ్ళు

కొందరిలో వేవిళ్ళు అతిగా వుంటాయి. మామూలుగా చికిత్స వల్ల తగ్గవు. ఇటువంటి అతివేవిళ్ళుని హైపర్ ఎమిసిస్ గ్రావిడేరమ్ అంటారు. ఈ అతివేవిళ్ళ వల్ల వాంతులు విపరీతంగా అయి గర్భిణీ క్షీణించిపోవడం జరుగుతుంది.

అతివేవిళ్ళుగా పేర్కొనబడే హైపర్ ఎమిసిస్ గ్రావిడేరమ్ పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడుతుందో స్పష్టమైన కారణం ఎందరిలోనూ కనబడదు. గర్భిణీలో కోరియానిక్ గొనాడో ట్రాఫిన్స్ అధికంగా ఉత్పత్తి అవడం ఒక కారణంగా భావించగా విటమిన్ -6 లోపం, ఎలర్జీ, న్యూరోసిస్ మరికొన్ని కారణాలుగా భావించటం జరుగుతుంది.

## 25. గర్భిణీ తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

ప్రతి గర్భిణీకి కొంతవ్యాయామం అవసరం. అయితే వ్యాయామంతోపాటు విశ్రాంతి తీసుకోవడం కూడా అంతగానే అవసరం. అందుకని మధ్యాహ్నంపూట కనీసం ఒక గంటయినా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.

గర్భిణీ ప్రక్కకు తిరిగి పడుకోవాలి

గర్భిణీ రోజూ రాత్రిపూట 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. నెలలె నిండుతున్న కొద్దీ నిద్ర మరింత అవసరం. పడుకున్నప్పుడు వెల్లకిలా కాకుండా ఒకపక్కకు తిరిగిపడుకోవాలి. అలా పడుకోవటం వలన గర్భిణీకి వచ్చే కాళ్ళవాపు అంతగా రాకపోవచ్చు.

గర్భిణీ గోరువెచ్చని వేడినీళ్ళతోనే స్నానం చేయాలి. మరింత వేడి వేడినీళ్ళు స్నానం చేస్తే కళ్ళుతిరిగి పడిపోయే ప్రమాదం వుంది.

కొందరు స్త్రీలు శుభ్రతకోసమని యోనిమార్గాన్ని రోజూ డూప్ చేసుకుంటూ వుంటారు. యోని పరిశుభ్రత అవసరమేకాని డూప్ చేసుకోవటం మాత్రం మంచిది కాదు. కేవలం జనవేంద్రియాలని కడుక్కోవాలి.

## స్థూలకాయం తెచ్చే నష్టం

స్థూలకాయం అయినప్పుడు కారు డ్రైవింగ్ ఎక్కువ దూరం చేయటం మంచిది కాదు. కారు డ్రైవింగ్ ఎక్కువ దూరం చేయటం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా అలసట చెందుతారు. అలాగే గర్బణి ఎక్కువ దూరం బస్సు ప్రయాణాలు చేయరాదు.

కాంప్లికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినవాళ్ళకి గర్భం వున్న సమయంలోనే మధ్య మధ్యలో కొంత బ్లిడింగ్ కనబడుతుంది. కడుపు బిగదీస్తూ వుంటుంది. మాయ సరిగ్గా వుండదు.

## గర్బణి స్త్రీ - విమానయానం

గర్బణి వీలైనంతవరకు విమానప్రయాణాలు మానివేయాలి. వేవిళ్ళు వున్నవాళ్ళకి విమానప్రయాణం వల్ల వాంతులు మరింత ఎక్కువై ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. కాంప్లికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినవాళ్ళు కూడా విమాన ప్రయాణాలు చేయకూడదు.

ఇటువంటివాళ్ళు విమానయానం చేస్తే విమానం 5 వేల అడుగులు ఎత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు గర్భస్థశిశువుకు తగినంత ప్రాణవాయువు అందకపోయే ప్రమాదం వుంది. అటువంటప్పుడు గర్భం నిలవని పరిస్థితి కలగవచ్చు. ఏ కాంప్లికేషన్లు లేని గర్బణి అయినా 3 నెలలు నిండి తర్వాత విమానయానం మానివేయాలి.

గర్భవతిగా వున్నప్పుడు టీకాలు, వ్యాధినిరోధక ఇంజక్షన్లు డాక్టరు సలహా లేనిదే తీసుకోకూడదు. మశూచికం టీకాలు, ఎల్లోఫీవర్ వ్యాక్సిన్ గర్బణికి మంచివి కావు. టైఫాయిడ్, కలరా వ్యాక్సిన్లు ఎంతో అవసరం అనుకుంటే తప్ప గర్బణి తీసుకోకూడదు. ఒక్కొక్కసారి ఈ టీకాలు, వ్యాక్సిన్లు వల్ల గర్భం పోవచ్చు.

## మలబద్ధకం ఉంటే ఏం చేయాలి ?

ఎందరో గర్బణిలలో మలబద్ధకం కనబడుతుంది. గర్బణిలో ప్రాజిస్టిరోన్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ విడుదల అవటం వల్ల, ఐరన్ టాబ్లెట్లు వాడటం వల్ల మలబద్ధకం కలిగే అవకాశం వుంది. ఆకుకూరలు తీసుకోవటం, కాయగూరలు ఎక్కువ తినటం, దంపుడు బియ్యం, తిరగలి బియ్యం తినడం చేస్తే మలబద్ధకం వుండదు.

గర్బణి మల బిగుతు దుస్తులు ధరించకూడదు. వక్షోజాలకి సపోర్ట్ గా బ్రా వాడవచ్చు. హైహీల్ షూస్ వాడకూడదు. మామూలుగా బూట్లని, చెప్పలని వేసుకోవాలి. హైహీల్ షూస్ వాడితే నడుంనొప్పి వస్తుంది.

కొందరు స్త్రీలు ధూమపానం చేస్తారు. గర్భవతిగా వున్న స్త్రీ ఆ అలవాటు మానుకోవాలి. ధూమపానం వల్ల బిడ్డ చాలా తక్కువ బరువులో పుట్టవచ్చు. లేదా నెలలు నిండకుండా కాన్పు అవ్వవచ్చు.

గర్బణి తన ఆరోగ్యం గురించి, తగిన అవగాహన కలిగి వుండాలి. అలాగే తాను చేసే పనుల వల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రతిభలు కలుగుతాయో కూడా తెలుసుకుని వుండాలి. అప్పడే తల్లి - బిడ్డ ఆరోగ్యం చక్కగా వుంటుంది.

## 26. గర్భిణీ తీసుకోవలసిన ఆహారం

గర్భిణీ సరైన పోషకాహారం తీసుకోవాలి. పోషకాహారం తీసుకోని పక్షంలో తల్లి నీరంసంగా తయారవుతుంది.

వంత ఏమంటే, తల్లి తిన్నా తినకపోయినా గర్భంలో ఎదిగే బిడ్డ తల్లిలో వున్న పోషక పదార్థాలన్నీ, తన సొంతం చేసుకుని ఎదిగిపోతుంది. అందుకనే చాలా సందర్భాలలో తల్లి బలహీనంగా మారుతుంది. బిడ్డ మాత్రం దబ్బపండులా వుడుతుంది.

అయితే కొందరు తల్లుల విషయంలో బిడ్డకు కావలసిన పోషక పదార్థాలు కూడా వుండవు. అటువంటి సందర్భాలలో తల్లి మరింత బలహీనపడటమే కాకుండా బిడ్డకూడా పీలగా వుడుతుంది.

### **తల్లిలో పోషకాహార లోపం - బిడ్డకు కలిగే నష్టం**

గర్భంలో ఎదిగే బిడ్డకు తల్లి నుండి సరైన ఆహారం అందకపోతే బిడ్డ మెదడు కణాలు కూడా వృద్ధి ఆవవు. దాంతో బిడ్డలో చురుకుదనం వుండదు.

గర్భిణీ మాంసకృత్తులు ఉండే ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. పప్పులు, చిక్కుళ్ళు, బఠానీలు, సోయాబీన్స్, వేరుశనగల్లో మాంసకృత్తులు ఎక్కువ శాతంలో వుంటాయి. అలాగే పాలు, పెరుగు, జిన్ను, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు వంటి వాటిలో మాంసకృత్తులు సమృద్ధిగా వుంటాయి.

గర్భిణీలో మెటబాలిజం ఎక్కువవుతుంది. పిట్టూటలీ, ఈస్ట్రోజన్, ప్రోజెస్టిరోన్, హార్మోన్లు ఎక్కువ విడుదల అవుతాయి. వీటి మూలంగా మాంసకృత్తుల అవసరమూ పెరుగుతుంది. అంతే కాకుండా గర్భిణీలో గర్భాశయం వృద్ధికి, వక్షోజాల పెరుగుదలకి, మాయ పెద్దదై బిడ్డకు తగినంత ఆహారం అందడానికి మాంసకృత్తుల అవసరం ఎంతైనా వుంది.

### **మాంసకృత్తుల అవసరం**

గర్భిణీ తీసుకునే మాంసకృత్తులు వీటికి ఉపయోగపడటమే కాకుండా కొంత నిల్వచేయబడతాయి. ఆ నిల్వ ఎందుకంటే గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలలో ఏ క్షణంలోనైనా ఆదనంగా మాంసకృత్తుల అవసరం రావచ్చు. అటువంటి సమయంలో తల్లిలో నిల్వ చేయబడిన మాంసకృత్తులు బిడ్డ అవసరాన్ని ఆదుకుంటాయి.

### **రక్తహీనతను తొలగించే ఆహారం**

గర్భిణీలో రక్తహీనత ఏర్పడటం అతి సహజం. గర్భిణీ తగినంత ఐరన్ తీసుకోకపోవడమే ఇందుకు కారణం. గోంగూర, బచ్చలి, ముదురాకుపచ్చ ఆకుకూరలు, రాగులు, సజ్జలు, కార్వం, కాలేయం, ఎండు చిక్కుళ్లలో ఇతర ఎండిన కాయలలో ఐరన్ సమృద్ధిగా లభ్యమవుతుంది.

గర్భంలో పిండం ఎదుగుదలకి ఐరన్తోపాటు ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం వుంది. ఐరన్ అభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలలోనే ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా వుష్కలంగా వుంటుంది.

గర్భిణీకి అయిదుమాసాలు నిండేసరికి ధైరాయిడ్ గ్రంథి ఎక్కువ పనిచేయడం మొదలవుతుంది. ఇటువంటి సమయంలో అయోడిన్ ఎక్కువ అవసరమవుతుంది. అయోడిన్ ఆకుకూరల్లో, కాయగూరల్లో, సముద్రం చేపలు, ఇతర జంతు జాలాల్లో ఎక్కువ లభ్యమవుతుంది. అందుకని గర్భిణీ వీటిని తరచూ తీసుకోవాలి.

## విటమిన్ డి పాత్ర

గర్భిణికి విటమిన్ డి అవసరం వుంది. తల్లి బిడ్డ ఎముకల పటిష్ఠతకి విటమిన్ డి తో పాటు కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ చక్కగా తోడ్పడతాయి. ఫార్మ్ లివర్ అయిల్, వెన్న, కోడిగుడ్లలో విటమిన్ డి వుంటుంది.

గర్భిణికి విటమిన్ కె కూడా అవసరమే. ఇది రక్తస్రావాన్ని ఆరికడుతుంది. క్యాబేజి, కాలిఫ్లవర్, సోయా బీన్స్, బచ్చలి, తేనెవంటి వాటిలో విటమిన్ కె లభ్యమవుతుంది.

పైన చెప్పిన విధంగా పోషకాహారం తీసుకుంటే తల్లి, బిడ్డ ఆరోగ్యంగా తయారవుతారు.

## 27. గర్భిణి స్త్రీకి బి-కాంప్లెక్స్ బిళ్లలు

గర్భిణి స్త్రీకి ఎక్కువగా ఐరన్ అవసరం వున్నట్లే బి-కాంప్లెక్స్ విలమిన్ల అవసరం కూడా ఎక్కువే. ముఖ్యంగా గర్భిణిగా వున్నప్పుడు ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం ఎక్కువ అవుతుంది. ఫోలిక్ యాసిడ్ బి-కాంప్లెక్స్ విటమిన్ల గ్రూపులో ఒకటి.

ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం గర్భిణి స్త్రీలో వున్నట్లయితే ఏదో ఒక వ్యాధి అతి తేలికగా సంక్రమిస్తూ వుంటుంది. పైగా ఏ వ్యాధి వచ్చినా త్వరగా ఎక్కువ అవుతుంది.

## గర్భిణి స్త్రీకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం

మామూలుగా స్త్రీకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం రోజుకి 50 నుంచి 100 మైక్రోగ్రాములు వుంటే గర్భం దాల్చిన తరువాత అదే స్త్రీలో రోజుకి 150 నుంచి 300 మైక్రోగ్రాముల అవసరం వుంటుంది. అందులోనూ గర్భస్థ శిశువుకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం తల్లిలోకంటే 4 రెట్లు వుంటుంది.

ఒకవేళ మాతృగర్భంలో కవలలు వుంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం ఐదురెట్లు పెరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ఫోలిక్ యాసిడ్ అందివ్వకపోతే కవలల ఎదుగుదల దెబ్బతింటుంది.

కొందరు గర్భిణి స్త్రీలు ఫోలిక్ యాసిడ్ వేసుకుంటున్నా ఒంటబట్టదు. వారిలో ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం కనబడుతూ వుంటుంది. దానికి కారణం వాళ్ళ ప్రేగుల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ పీల్చుకోవడానికి అనుకూల వాతావరణం లేకపోవడమే. అనుకూల వాతావరణం లేకపోవడానికి వారి ఆహారంలో తగినంత విటమిన్ సి లేకపోవడం లేదా విటమిన్ సి వేరుగా తీసుకొనకపోవడం కారణం. విటమిన్ సి లోపం వుంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఒంటికి పట్టదు. ఆరోగ్యానికి తోడ్పడదు. గర్భిణి స్త్రీ ఫోలిక్ యాసిడ్ తో పాటు విటమిన్ సి కూడా తీసుకోవాలి.

కొందరు గర్భిణి స్త్రీల ప్రేగుల్లో పాములు వుంటాయి. వాటివల్ల కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ తల్లికి చేరదు. కడుపులో పాములున్నప్పుడు పడిపోవడానికి మందులు వాడాలి.

గర్భిణి స్త్రీలలో ఐరన్ లోపం వల్ల రక్తహీనత కలగడం ఎంత సాధారణమో ఫోలిక్ యాసిడ్, బి-కాంప్లెక్స్ లోపం వల్ల కూడా రక్తహీనత కలగడం అంతగానే సాధారణం.

## బి-కాంప్లెక్స్ లోపంతో నోటిపూత

ఫోలిక్ యాసిడ్, బి-కాంప్లెక్స్ లోపం వున్న గర్భిణీ స్త్రీలలో నోటిపూత వుంటుంది. ఏది తినాలన్నా, నోటి మంట వుంటుంది. రక్తహీనత వుంటుంది. ఒంటికి కూడా నీరు వస్తుంది. కొందరిలో ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల రక్తహీనత ఎక్కువైగుండే కూడా పెరుగుతుంది.

ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇతర బి-కాంప్లెక్స్ లోపం వున్న గర్భిణీ స్త్రీలో కాన్పు నొప్పులు రాకుండానే మాయ వేరు అవుతుంది. రక్తస్రావం వుంటుంది. కొందరిలో గర్భస్రావం కూడా జరిగిపోతుంది.

అంతేకాదు. జన్మసంబంధమైన లోపాలు ఏర్పడటానికి ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. ఈ విషయం తెలియక గ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీ బయట తిరగడం కారణం అనుకుంటారు. వాటిని గ్రహణం మొర్రెలనుకుంటారు. వాస్తవానికి గ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీ బయట తిరగడం వల్ల ఎటువంటి అంగవైకల్యం ఏర్పడదు.

## గర్భిణీ స్త్రీలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడని నోటిపూత

గర్భిణీ స్త్రీ నోటిపూత, నాలికపూతలని అంత తేలికగా తీసుకోకూడదు. ఆ పూతలు వారిలో ఏర్పడిన బి-కాంప్లెక్స్, ఫోలిక్ యాసిడ్ ల లోపాలకి చిహ్నంగా గుర్తించాలి.

ఫోలిక్ యాసిడ్ మనం తీసుకునే ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, లివరు, కోడిగుడ్లలో ఎక్కువగా లభ్యమవుతుంది. ఫోలిక్ యాసిడ్ కేవలం గర్భిణీ స్త్రీలకే కాకుండా బిడ్డకి పాలు ఇస్తున్న తల్లిల్లో కూడా ఎక్కువగానే అవసరం.

### 28. పాలు ఎక్కువ పడాలంటే తల్లి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి

తల్లిపాలు కంటే శ్రేష్ఠమైనవి మరొకటి లేవు. సాధారణంగా తల్లి మామూలుగా తీసుకునే ఆహారమే పుష్కలంగా పాలుపడటానికి సరిపోతుంది. కానీ తల్లి ఆహారంలో పళ్ళు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇవి పాలు ఉత్పత్తికి ఎక్కువ తోడ్పడతాయి. వరి, గోధుమ, జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులుతో చేసిన వివిధపదార్థాలు పాలు ఉత్పత్తికి దోహదం చేస్తాయి. వివిధ పప్పుదినుసులు కూడా పాల ఉత్పత్తికి అవసరమే, పెరుగు, పాలుకూడా పాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి.

## పాలు ఎక్కువ తాగితే బిడ్డకి ఎక్కువ పాలు పడతాయా ?

పాలుతాగితే చాలు తల్లికిపాలు ఎక్కువ పడతాయనేది నిజం కాదు. పాలు తయారవడానికి తాగే పాలు ఒక్కటే సరిపోవు. ఆహారం సమపాళ్ళల్లో అన్నీ కలిగివుండాలి. మాంసం తినే వాళ్ళు కోడిగుడ్డు, మాంసం, చేపలు తీసుకోవటం మంచిది.

పై ఆహారపదార్థాలన్నీ ఒకేరోజు అన్నీ తీసుకోవాలని కాదు. కానీ ప్రధానంగా ఆహారంలో ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, పప్పులు వుండాలి. రోజు అన్నిరకాల పప్పులు తీసుకోవసరం లేదు. ఒక్కొక్కరోజు ఒక్కొక్కరకం పప్పు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు తీసుకోవటం అవసరం.

ఆహారంతోపాటు మంచినీళ్ళు కూడా ఎక్కువగా తాగాలి. బాలింతరాలు మంచి నీళ్ళు ఎక్కువతాగితే బిడ్డకు పడిశం చేస్తుందనే అపోహ ఒకటివుంది. అది నిజం కాదు.

## తల్లి తీసుకునే ఆహారం బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపిస్తుందా ?

తల్లి తీసుకునే ఆహారం సక్రమంగా లేకపోతే బిడ్డకు అనారోగ్యం కలుగుతుందని అనుకుంటారు. తల్లి నారింజ, నిమ్మవంటివి తీసుకున్నా ద్రాక్షపళ్ళు తిన్నా బిడ్డకు పడిశం పడుతుందనుకుంటారు. అది నిజం కాదు. అలా తల్లి తీసుకునే ఆహారం బట్టి బిడ్డకు విరోచనాలు, వాంతులు అవుతాయనుకుంటారు. బిడ్డకయ్యే వాంతులు విరోచనాలకి, తల్లి తీసుకునే ఆహారానికి సంబంధం లేదు. అందరూ తీసుకునే ఆహారమే బాలింతరాలు కూడా నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. అన్నిపళ్ళు, పళ్ళరసాలు ఎటువంటి జంకులేకుండా తీసుకోవచ్చు.

కొందరు తల్లులకి ఏమి తీసుకున్నా పాలు తక్కువగా వుంటాయి. పెరినార్ట్ 10 యం.జి. టాబ్లెట్లు ఉదయం-1, మధ్యాహ్నం-1, రాత్రి-1 చొప్పున పదిరోజులు వాడితే పాలు ఎక్కువపడే అవకాశం వుంది. పాలుపడటానికి ఇంకా కొన్నిరకాల మందులు కూడా వున్నాయి. డాక్టర్ సలహామేరకు వాటిని వాడవచ్చు.

బిడ్డపుట్టిన గంటకే రొమ్ము పట్టించినట్లయితే బిడ్డ కలిగించే సక్రింగ్ లిఫ్లెక్స్ తో పాలు త్వరగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. కాన్పు అయిన మొదటి 2-3 రోజులు పాలు లేకపోయినా ప్రతి 2-3 గంటలకి ఒకసారి తల్లి స్తన్యాన్ని బిడ్డనోటికి అందించాలి. దాంతో పాలు చక్కగా పడటానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

## మొదట్లోపడే తల్లిపాలు బిడ్డకి అమృతం

అంతేకాక కాన్పు అయిన మొదటి 2-3 రోజులలో తల్లి రొమ్మునుంచి వచ్చే ద్రవం బిడ్డకి భవిష్యత్తులో కలగబోయే వ్యాధుల నుండి రక్షణ కలిగిస్తుంది. కొందరు తల్లులు ఈ ద్రవాన్ని పిండి పారబోస్తారు. అది చాలా తప్పు. బిడ్డచేత రొమ్ము పట్టించి వాటిని తప్పక తాగించాలి.

మామూలుగా బిడ్డకు రక్తం పట్టడానికి తల్లినుండి అందే ఐరన్ సరిపోతుంది. కానీ పోషకాహార లోపంతో రక్తహీనతతో వున్న తల్లులనుండి బిడ్డకు తగిన ఐరన్ అందదు. అటువంటి పిల్లలకు ఐరన్ కి సంబంధించిన చుక్కల మందులు, ప్రాటీన్ చుక్కల మందులు వాడాలి.

## గ్రెప్ వాటర్ అవసరమా ?

తల్లిపాలతో బాటు బిడ్డకు గ్రెప్ వాటర్ ఇవ్వాలనుకుంటారు. బిడ్డకు గ్రెప్ వాటర్ పట్టనవసరంలేదు. పైగా గ్రెప్ వాటర్ పట్టడం వల్ల బిడ్డకు నష్టం కలిగే ప్రమాదముంది.

తల్లికి తీవ్రమైన అనారోగ్యం కలిగినప్పుడు, ఎయిడ్స్, కాన్సర్ వచ్చినప్పుడు, రేడియం ట్రీట్ మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు బిడ్డకు పాలు ఇవ్వకూడదు. తల్లికి మామూలుగా జ్వరం వచ్చినా, విరోచనాలు, వాంతులు అవుతున్నా, ఇతర సాధారణ అనారోగ్యం ఏదికలిగినా మామూలుగానే పాలు ఇవ్వవచ్చు.

## 29. బాలింతరాలిలో మైల ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? దాంపత్యం ఎంత కాలానికీ ?

కాన్పు అయిన తరువాత బాలింతరాలులో కొంత మైల వుంటుంది. ఈ మైలని లోభియా అంటారు. మొదటి మూడు రోజుల లోభియా ఎర్రగా వుంటుంది. ఆ తరువాత 10 రోజుల వరకు తెలుపులో వుంటుంది.

మొదటి 3 రోజుల కనబడే ఏరుపు లోభియాలో కొద్దిగా రక్తం వుంటుంది. కానీ ఆ తరువాత కనబడే లోభియాలో అసలు రక్తం వుండదు. ఒకవేళ వున్నా గుర్తించలేనంతగా చాల పలచగా వుంటుంది.

కాన్పు అయిన 10వ రోజు నుంచి మరికొన్ని రోజులుపాటు లోభియా (మైల) నీరులాగా వుంటుంది. సాధారణంగా బాలింతరాలులో కనబడే మైల దుర్వాసన వుండదు.

### **బాలింతరాలులో మైల దుర్వాసన ఎందుకు ?**

బాలింతరాలులో మైల దుర్వాసన వుంటే ఇన్ఫెక్షన్ వుందని తెలుసుకోవాలి. బాలింతరాలు మైలలో బాక్టీరియా క్రిములు చేరి వ్యాధి లక్షణాలని కలుగజేయడంతో దుర్వాసన వుంటుంది.

మైల వాసన అనిపించగానే బాలింతరాలు మర్తవయవాలని డూప్ చేసుకుని శుభ్రపరుచుకోవాలి. రోసిలిన్ -500 గానీ, మరొక యాంలిబయాటిక్ గానీ వాడాలి. ఫ్లాజిల్ -400 టాబ్లెట్లు ఒకటి తడవకి ఒకటి చొప్పున రోజుకి మూడు వాడాలి. అలా వారం రోజులు వేసుకోవాలి. మార్కావయవాలని శుభ్రపరుచుకుని యాంలిబయాటిక్ పొడరు అద్దుకోవాలి.

బాలింతరాలు మైలని నిర్లక్ష్యం చేస్తే చలిజ్వరం రావడం. పొత్తికడుపు బిగబీయడం. నడుము నొప్పి అనిపించడం వుంటాయి. వెంటనే చికిత్స పొందకపోతే గర్భాశయం పక్కన వుండే పేగులు వాస్తాయి. అక్కడ చీముగడ్డలు కూడా తయారవచ్చు.

అందుకనే బాలింతరాలు తన మైల విషయంలో మెలకువగా వుండాలి. లేకపోతే గర్భాశయం పక్కన వుండే ఫెల్లోపియన్ ట్యూబులు ( అండవాహికలు ) మూసుకుపోయి మళ్ళీ గర్భం వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోవచ్చు.

కొందరికైతే గర్భాశయం పక్కన ఏర్పడిన చీముగడ్డలు నెలలపాటు బాధ కలిగిస్తాయి. అందుకనే బాలింతరాలు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. డైవర్స్ కింద పాతగుడ్డలు వాడకుండా కేర్ ఫ్రీ వంటివి వాడాలి. ప్రతీ బాలింతరాలు డైపర్స్ విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి.

### **కాన్పు అయిన ఎంతకాలానికీ పాలు పడతాయి ?**

బాలింతరాలుకి పాలు పడటానికీ రెండు-మూడు రోజులు పడుతుంది. కానీ అంతవరకు ఆగకూడదు. కాన్పు అయిన కొద్ది గంట్లోనే రొమ్ము పట్టించాలి. రొమ్ము పట్టించడం వల్ల త్వరగా పాలుపడతాయి.

మొదటి రెండు-మూడు రోజులు పాలు లేకపోయినా పాలవంటి ద్రవం రొమ్ముల నుంచి వెలువడుతుంది. దీనినే కొలస్ట్రం అంటారు. ఇందులో చంటిబిడ్డ ఆరోగ్యానికీ అవసరమైన యాంటీబాడీస్, విటమిన్ ఎ వుంటాయి. ఇవి జీవితాంతం బిడ్డకు తోడ్పడతాయి. కొందరు తల్లులు ఈ విషయం తెలియక వీటిని మురుగుపాలు అని పిండి పారబోస్తారు. మొదటి రెండు రోజులు చంటి బిడ్డకు రొమ్ము పట్టిస్తూనే పక్కన పంచదార నీళ్ళు పట్టాలి.

## చనుమొనలు చిన్నగా ఉంటే పాలు ఇవ్వటం ఎలా ?

బాలింతరాలు తన రొమ్ములని తడిగుడ్డతో శుభ్రంగా తుడిచి పాలు ఇవ్వాలి. కొందరు తల్లులకి చనుమొనలు పగిలి వుంటాయి. ఇటువంటి తల్లులు డాక్టర్ సలహా పై మందులు వాడితే పగుళ్ళు తగ్గిపోతాయి. కొందరు తల్లులకి చనుమొనలు నోటికి అందకుండా చిన్నవిగానో, లోపలికి ముడుకుపోయో వుంటాయి. ఇటువంటి తల్లులు నిపిల్ షీట్ సహాయంతో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి.

కాన్పు సమయంలో జననేంద్రియాల దగ్గర కుట్టు పడినవాళ్ళు రోజూ డెట్టాల్ నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. శుభ్రమైన డైపర్స్ వాడాలి.

దాంపత్య సంబంధాలలో కాన్పు అయిన 4-6 వారాల నుంచి పొల్గినవచ్చు. అంతేకానీ 4-5 నెలలు దూరంగా వుండనవసరం లేదు. చాలామందికి కాన్పు అయిన 3 నెలలకే రెగ్యులర్ మెన్స్ మొదలవుతుంది. కొందరిలో మాత్రం ఆరు నెలలు పడుతుంది. దాంపత్యంలో పొల్గినప్పటికీ మెన్స్ కనబడకుండానే గర్భం రావచ్చు. అలా వెంటనే గర్భం రావడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. తగిన కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అవలంబించాలి. వెంటనే గర్భం రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

### 30. కాన్పు తరువాత సెక్స్ తృప్తిలో తేడా

కాన్పు అయిన స్త్రీలో సెక్స్ ఎడల ఆసక్తి తగ్గిపోతుందని, పూర్వంలాగా ఎంజాయ్ చేయడం వుండదని అనుకుంటారు. అలాగే భర్తకీ పూర్వంలాగా సెక్స్ లో తృప్తి లభించదని అనుకుంటారు. కానీ నిజం కాదు.

కాన్పు అయిన తరువాత కొద్దివారాల పాటు స్త్రీ శారీరక, మానసిక పరిస్థితుల్లో కొంత తేడా కనబడుతుందే తప్ప శాశ్వతం కాదు. కాన్పు వల్ల తాత్కాలికంగా కొంత నీరసం ఏర్పడుతుంది. దానికి తోడు చంటిబిడ్డ వుండడంతో సరైన నిద్ర, విశ్రాంతి కరువు అవుతుంది. దీని వల్ల స్త్రీలో అలసట కనబడుతుంది. అలసిపోయిన స్త్రీలో కాన్పు అయిన కొన్ని వారాల వరకు సెక్స్ ఆసక్తి కనబడదు. అంత మాత్రాన ఆమెలో కాన్పు వల్ల సెక్స్ తగ్గిపోవడం కాదు.

### కాన్పు అయిన నెలకే దాంపత్య సంబంధాలు

కాన్పు అయిన నెలరోజుల నుంచి మామూలుగా దాంపత్య సంబంధాలలో పొల్గినవచ్చు. కాన్పు సమయంలో యోని దగ్గర కుట్టుపడినా నాలుగు వారాలలో పూర్తిగా మానిపోతాయి. కొందరిలోనే కొద్దిగా నొప్పి వుండతాయి. కానీ నిదానంగా ఆ నొప్పి కూడా తగ్గిపోతుంది.

సిజేరియాన్ కాన్పు అయినప్పటికీ నెల రోజులు నిండిన దగ్గరనుంచి దాంపత్య సంబంధాలలో పొల్గినవచ్చు. కానీ వెంటనే గర్భం రాకుండా 2-3 సంవత్సరాలు కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అవలంబించాలి.

కాన్పు తరువాత కొందరు తల్లుల రొమ్ములు సలపరంగా వుంటాయి. బిడ్డకి పాలిచ్చే తల్లుల్లో రొమ్ముల సలపరం వుండదు. సెక్స్ విషయంలో తీసుకుంటే పాలిచ్చే తల్లుల్లో త్వరగా స్పందించడం వుంటుంది. బిడ్డకు పాలివ్వని తల్లుల్లో త్వరగా స్పందించడం కనబడదు.

కాన్పు అయిన వెంటనే బిడ్డకు స్తన్యం అందించే తల్లిల్లో త్వరగా పాలు పడతాయి. మెదడులో వుండే పిట్టాటల గ్రంథి నుండి ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ విడుదల అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ పాలిండ్లలోని పాలు విడుదలయ్యేటట్లు స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. తర్బవతిగా వుండగా బాగా పరిమాణం పెరిగిన గర్భాశయాన్ని కుదించేటట్లు చేస్తుంది.

### పుట్టిన బిడ్డ ఆలస్యంగా రొమ్ము పట్టితే పాలు పడటం కూడా ఆలస్యమే

బిడ్డకు స్తన్యం అందివ్వడంతో ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్ కూడా విడుదలై పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్ కనీసం మూడు నెలలు అధికశాతంలో విడుదలవుతుంది. ఈ హార్మోన్ అధికశాతంలో వుండగా అండం విడుదల మాత్రం వుండదు.

బిడ్డకు పాలు ఇవ్వని తల్లిల్లో అండం 1-2 నెలల్లోనే విడుదల అవుతుంది. ఆక్సిటోసిన్, ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్లు కాన్పు అయిన తరువాత జననేంద్రియాలు సెక్స్ కి అనుకూలంగా తయారవడానికి తోడ్పడతాయి.

కాన్పు తరువాత 3-4 వారాలకి బాహ్య జననేంద్రియాలు, యోనిమార్గం, గర్భాశయం పూర్వస్థితికి చేరుకుంటాయి. యోనిమార్గం గోడల్లోని కండరాలు పూర్తి టెంపర్ పాంది యధాస్థితికి చేరుకుంటాయి. యోనిమార్గంలోని గ్రంథలు ద్రవాలని విడుదల చేస్తాయి.

కాన్పు అవడంతో యోని వదులయి, దానివల్ల సెక్స్ లో అసంతృప్తి కలుగుతుందని స్త్రీలూ అనుకుంటారు. పురుషులూ అనుకుంటారు. యోని టూజవడానికీ, కాన్పుకీ సంబంధం లేదు. సంతానం కలగకపోయినా యోని టూజవుతుంది.

### కాన్పు అయిన వారిలో యోని లూజు

బలహీనంగా వుండి కండ పటుత్వం లేని వారికి కాన్పు అయినా అవకపోయినా యోని టూజు అనిపిస్తుంది. పెల్విక్ కండరాల్లో పటుత్వం, టెంపర్ వున్న వాళ్లకి కాన్పు అయినా పూర్వంలాగానే టైట్ గా వుంటుంది. కాన్పు అవడం వల్ల సాగిన పెల్విక్ కండరాలు రెండు మూడు వారాల్లోనే మామూలు స్థితికి చేరుకుంటాయి. పెల్విక్ ఎక్స్ సైజ్ ద్వారా మరింత త్వరగా పటిష్టంగా మారతాయి.

చక్కని ఆహారం, విశ్రాంతి, మానసిక ప్రశాంతి వుంటే సెక్స్ కోరిక మామూలుగానే వుంటుంది. అనారోగ్యం, అలసట, సెక్స్ ఎడల అనాసక్తికిని పెంపొందిస్తాయి.